Nombre de alumno: Victor Calvo Vázquez

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Nombre del trabajo: Cuadro Sinóptico

Materia: zootecnia de Ovinos Y Caprinos

Grado: 7

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de octubre de 2023


Unidad II. Reproducción
Características reproductivas de la hembra
Son animales poliéstricos (varios ciclos de celo) estacionales de días cortos. Su actividad reproductiva se incrementa cuando los días comienzan a acortarse, alcanzando su máxima expresión en otoño e invierno
Características reproductivas de la hembra caprina
La producción y liberación de gametos viables, La duración normal del ciclo estral es de 18-23 d (media= 21 d). Se consideran ciclos cortos los menores de 18 d
La duración de la gestación es de 145-155 d, media 150 d. La cabra es cuerpo-kitzo dependiente para mantener toda la gestación
Los signos del estro son: inquietud, falta de apetito, búsqueda del macho, bala con frecuencia, movimiento de la cola ("banderillco"). La conducta homosexual es algo frecuente entre hembras
Manejo reproductivo
Se sugiere elegir un carnero o chivo en el momento del destete (en el mismo rebaño o hato). Su condición y peso deben ser superiores a los de sus contemporáneos, debe contar con sus dos testículos y estar libre de defectos
El carnerillo o chivito elegido deberá ser observado al año de vida para verificar que mantenga las características deseables
Manejo de hembras y sus crías
Una buena práctica es comprar hembras que por lo menos tengan una cría en pie o que hayan criado exitosamente una o más crías al destete
Se recomienda cruzar hembras primerizas cuando alcancen 16-20 kg o, aproximadamente, 1.5 años. Hembras primerizas requieren mayor atención
Otros aspectos reproductivos
El cuidado de ovejas se centra principalmente en la cría de los corderos para obtener carne y la de ovejas para la lana. También se puede criar para obtener leche. Algunos ganaderos se especializan en criar ovejas para su venta
Calidad
Raza muy variada, tiene alta rusticidad, y mediana prolificidad, se han reportado valores de promedio de peso de vellón de 1.5 kg, peso vivo de 27 kg, para ovejas, y de 37 kg para carneros. Actualmente se constituye la raza ovina de mayor población en el país.
Cuidado
Son vacunados cuando son recién nacidos. Los corderos obtienen sus primeros anticuerpos por medio del calostro, luego por medio de la vacunación cada seis semanas durante tres meses y, por último, con vacunas de refuerzo cada seis meses
Producción
Países que producen más carne ovina indígena por orden de cantidad son: Australia, Irán, Turquía, Siria, India, España y Pakistán.También china
Reproducción
Las hembras tienen un embarazo de unos cinco meses y paren entre uno y tres corderos a la vez, pueden parir una o dos veces al año
Nutrición
Su alimentación debe alcanzar un buen balance de proteínas y de energía para permitir un nivel deseable de producción, Un ovino o caprino adulto requiere un monto de forraje fresco (en verde) igual a 15% de su peso vivo
Los minerales son importantes. La sal, preferiblemente yodada, debe suministrarse en bloques colocados en el corral para su libre consumo
Melaza; Algunos minerales como sal, magnesio; alimentos fibrosos como los rastrojos, pajas, cascarillas y bagazos y Calhidra Los animales deben contar con libre acceso al agua
Control de la reproducción en la oveja
La época del año o estacionalidad: Su efecto es directo sobre características reproductivas de las ovejas a través del fotoperiodo
La nutrición:. Lo cierto es que el peso vivo del animal, la condición corporal y un incremento en la calidad nutricional por un corto lapso de tiempo (práctica llamada flushing), afectan positivamente la tasa de ovulación.
El estrés: En general el estrés tiene un efecto negativo sobre el proceso reproductivo, que se manifiesta en la demora o abolición del comportamiento sexual la disminución de la tasa de ovulación y la reducción de la espermatogénesis
Influencias sociales o de relaciones dentro de una especie: Pueden tener un efecto sobre la reproducción como el denominado "efecto macho", o respuesta inductora de la actividad reproductiva que produce en un piño de hembras en anestro estacional
Inseminación artificial
Es una técnica de reproducción que consiste en depositar el semen de los machos colectado artificialmente en el tracto reproductivo de las hembras para producir la fecundación de los óvulos maduros
Métodos
Pericervical o exocervical
Intrauterina vía trans-cervical
Intrauterina utilizando un laparoscopio