

Nombre del alumno: Elisa Aurora Lopez Santiago.

Nombre del profesor: Gonzalo Rodriguez Rodriguez.

Nombre del trabajo: La alimentacion.

Materia: Zootecnia de Conejos.

Grado:7

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 05 de noviembre de 2023.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO DEL CONEJO

Tanto el conejo salvaje como el domestico comen las 2/3 partes de su alimento total entre el crepúsculo y el amanecer, 1/3 durante el día, entre 27 - 30 pequeñas comidas.

Cuando se encuentra en calma se produce un tipo especial de heces (cecotrofos) las que ingiere tomándolas directamente de su ano.

Sin masticar, pero ensalivándolo, traga de 50 a 60 g. de cecotrofos que son muy ricos en proteína

APARTO DIGESTIVO

La fermentación cecal en los conejos es independientemente del nivel de fibra en la dieta y produce una cantidad de ácidos volátiles que es equivalente al 10-12%

El conejo produce dos tipos de excrementos blandos y duros y cuya composición es bastante diferente

La cecotrofia no es una función anormal sino todo lo contrario, pues debido a esta función, los alimentos se aprovechan al máximo.

NECESIDADES NUTRICIONALES.

La conversión alimenticia es aproximadamente de 2:1 a las 4 semanas de vida, pero disminuye a 3:1 a la 8ª semana.

Después de la 8ª-9ª semana la conversión alimenticia se deteriora rápidamente, llegando a ser de 4:1 a la 10ª semana y de 5:1 o más a la 12ª semana.

Un conejo de carne debería llegar a tener 2.2 a 2.5 kg de peso vivo a las 11 semanas de vida.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

REQUERIMIENTOS

el gazapo tiene una alta y continua tasa de crecimiento exponencialmente hasta la 10ª - 12ª semana de vida

El gazapo casi duplica su peso cada semana hasta que llega a los 250 gr a la segunda semana de vida.

Durante la tercera semana la velocidad de crecimiento por lo general se estabiliza en aproximadamente 15 gr diarios, debido al consumo limitado de leche.

TIPOS DE ALIMENTO

1. Granjas que manejan tres piensos: Pienso base para todos los animales (reproductores y engorde). Pienso medicado o antiestrés para los gazapos después del destete. Pienso blanco o de retirada (sin medicación), obligatorio su administración 5 días antes del sacrificio de los gazapos de carne.

Granja que manejan cuatro piensos: Pienso para reproductoras. Pienso para el engorde. Pienso medicado. Pienso de retirada o pienso blanco. En este caso el único pienso que posee una composición diferente al resto es el de reproductoras, fundamentalmente en lo que respecta al nivel de proteína.