



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

UDS

MATERIA:

NUTRICION EN ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

PROFESORA: **DANIELA MONSERRAT MENDEZ**

CUADRO SINÓPTICO

ALUMNO:

JONATHAN JIMENEZ GOMEZ

4° CUATRIMESTRE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 11 DE NOVIEMBRE
DEL 2023

PATOLOGIAS INTESTINALES

RESECCIÓN INTESTINAL

La cirugía colorrectal es uno de los procedimientos quirúrgicos sobre el tracto digestivo que se realizan con mayor frecuencia como

- colostomía - Es una cirugía que se lleva a cabo para crear una abertura llamada estoma.
- colectomía - Extirpación quirúrgica o resección de una parte enferma del intestino grueso.
- ileostomía - Es una abertura en el vientre (pared abdominal) que se hace mediante una cirugía.
- fístula - Abertura anormal o pasaje entre dos órganos, o entre un órgano y la superficie del cuerpo

LA CIRUGÍA COLORRECTAL

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso (colon). El colon es la parte final del tubo digestivo. características de la enfermedad son:

- sintomas - Diarrea o estreñimiento, sangrado rectal, Debilidad o fatiga, Una sensación de que el intestino no se vacía por completo y Pérdida de peso
- Causas - comienza cuando las células sanas del colon desarrollan cambios (mutaciones) en su ADN. El ADN
- Factores de riesgo - edad avanzada, raza afroamericana, cancer colorrectal, afecciones intestinales inflamatorias, Dieta con bajo contenido de fibra y Diabetes

APENDICITIS

Es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen. Características de la enfermedad son:

- sintomas - Náuseas y vómitos, Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen, Pérdida de apetito, Estreñimiento o diarrea
- Causas - La causa probable de la apendicitis es una obstrucción en el recubrimiento del apéndice que da como resultado una infección
- Complicaciones - La apendicitis puede causar complicaciones graves, por ejemplo:
 - La perforación del apéndice
 - Una acumulación de pus que se forma en el abdomen

DIARREAS

Es la evacuación intestinal de heces flojas y líquidas tres o más veces al día puede ser:

- Aguda - Es un problema común que generalmente dura de 1 a 2 días y desaparece espontáneamente por causas:
 - Infecciones
 - Alergias e intolerancias a los alimentos
 - Efectos secundarios de las medicinas
- Cronica - La diarrea crónica dura por lo menos 4 semanas por causas:
 - Enfermedad celiaca o de Crohn
 - síndrome de intestino irritable y otros trastornos gastrointestinales funcionales
 - colitis ulcerativa (también conocida como colitis ulcerosa)

COLITIS ULCEROSA

Es una enfermedad intestinal inflamatoria que provoca inflamación y úlceras (llagas) en el tracto digestivo. La colitis ulcerosa afecta el revestimiento más profundo del intestino grueso (colon) y el recto. sus características son:

- Síntomas - Los síntomas de la colitis ulcerosa pueden variar, según la gravedad de la inflamación y el lugar donde se produzca algunos son:
 - Diarrea, a menudo con sangre o pus, dolor en el recto, cólicos, Incapacidad para defecar a pesar de la urgencia
- Tipos - Los médicos suelen clasificar la colitis ulcerosa según su ubicación como:
 - Proctitis ulcerosa
 - Proctosigmoiditis
 - Colitis del lado izquierdo
 - Pancolitis
- Factores de riesgo - Afecta casi por igual a mujeres y hombres. Los factores de riesgo pueden incluir:
 - Edad
 - Raza u origen étnico
 - Antecedentes familiares
- complicaciones - Sangrado intenso, Orificio en el colon (colon perforado), Deshidratación grave, Pérdida de masa ósea (osteoporosis), Inflamación en la piel, las articulaciones y los ojos

PATOLOGIAS INTESTINALES

FISURAS ANAL

Es un pequeño desgarro en el tejido delgado y húmedo (mucosa) que recubre el ano características incluyen:

Sintomas

Dolor durante la evacuación intestinal, sangre roja en heces, unagrieta visible en la piel alrededor del ano y un n bulto pequeño o un fibroma blando en la piel cercana a la fisura anal

causas

Frecuentes de la fisura anal son las siguientes: Evacuar heces grandes y duras, estreñimiento, diarrea crónica, sexo anal y parto

Menos frecuentes de las fisuras anales son las siguientes: Enfermedad de Crohn, cáncer anal, VIH, Tuberculosis y sífilis

Factores de riesgo

- Estreñimiento
- Parto
- Enfermedad de Crohn
- sexo anal
- La edad

Complicaciones

- Imposibilidad de curación
- Recurrencia
- Un desgarro que se extiende a los músculos circundantes

DIVERTÍCULOS

son bolsas abultadas y pequeñas que se pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo. Por lo general, se encuentran en la parte inferior del intestino grueso (colon) características:

sintomas

Dolor en la parte inferior izq del abdomen, náuseas, vómito, fiebre, sensibilidad abdominal y estreñimiento

causas

se suelen desarrollar cuando lugares naturalmente débiles en tu colon ceden bajo presión

Factores de riesgo

Envejecimiento, Obesidad, Tabaquismo, falta de ejercicio, ciertos medicamentos y una dieta en grasa animal alta y poca fibra

prevención

realizar ejercicio con regularidad, come más fibra, bebe mucho líquido y evitar fumar

FISTULAS

Es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo, como un órgano o un vaso sanguíneo y otra estructura. Generalmente, las fistulas son el producto de una lesión o cirugía. tipos:

Ciegas (están abiertas en un solo extremo, pero conectan a dos estructuras)

Completas (tienen aberturas tanto adentro como afuera del cuerpo)

En herradura (conectan el ano a la superficie de la piel después de circundar el recto)

Incompletas (un tubo desde la piel cerrado en su interior y que no conecta con ninguna estructura interna)

CX

La colectomía es un procedimiento quirúrgico en el que se extirpa todo el colon o parte de este tipos de operaciones:

La colectomía total implica la extirpación de todo el colon.

La colectomía parcial implica la extirpación de parte del colon; también se la puede llamar colectomía subtotal.

La hemicolectomía implica la extirpación de la parte derecha o izquierda del colon.

La proctocolectomía implica la extirpación tanto del colon como del recto

SANGRADO DEL TUBO DIGESTIVO INFERIOR

El sangrado del tracto gastrointestinal inferior es una condición médica en donde se presenta una hemorragia desde la parte inferior del sistema digestivo, específicamente del intestino grueso, el recto o el ano. características:

sintomas

El síntoma más común es un sangrado rojo brillante desde el ano o en las heces, dolor abdominal, mareos, palpitaciones, debilidad, confusión y desmayo

Tratamiento

depende de la cantidad de sangre perdida y de la causa de la hemorragia. La causa debe investigarse y tratarse para evitar futuros sangrados.

Pronóstico

depende de la causa de fondo. El pronóstico de recuperación a menudo es bueno si se encuentra y se trata la fuente de la hemorragia.