



Super nota

Nombre del alumno: Elizabeth Hernández Santiz

Nombre del tema: Cuidados inmediatos y mediatos en el recién nacido

Parcial: I

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: Lic. María del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre 4°A

CUIDADOS INMEDIATOS Y MEDIATOS EN EL RECIÉN NACIDO

INMEDIATOS

Se llevan a cabo al momento del nacimiento, en la sala de expulsión, para detectar las distintas condiciones perinatales, valorando los antecedentes disponibles

VÍA AÉREA Y ASPIRACIÓN DE SECRECIONES

- Aspirar nariz y boca con una perilla de látex estéril.
- Inclinar el cuerpo ligeramente hacia abajo (drenaje postural).
- Valorar presencia de meconio, de haber aspirado se debe realizar laringoscopia para aspirar partículas de meconio que se encuentren en la vía aérea.

CORDÓN UMBILICAL

- El pinzamiento y corte del cordón umbilical se debe realizar de 30 a 60 segundos después del nacimiento, aun siendo prematuros, manteniendo a la persona recién nacida por abajo del nivel de la placenta.
- Previamente se extrae del mismo una muestra, tanto para determinar grupo sanguíneo y Rh, y para la prueba de Coombs.

VALORACIÓN CLÍNICA

- El Apgar se valoran al minuto y a los 5 minutos de haber nacido para verificar el estado de salud del recién nacido.
- Valorar mediante el test de Silverman la dificultad o depresión respiratoria.

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

- Secar para evitar la pérdida de calor por evaporación
- Evitar el contacto con objetos fríos por pérdida de calor por conducción.
- Mantener en cuba radiante a temperatura estable 36-38° C.

MEDIATOS

Se llevan a cabo en la sala de perinatos, contribuyen a la adecuada valoración y transición del recién nacido a la vida extrauterina, además ayudan a detectar anomalías al nacimiento.

SOMATOMETRÍA

- Determina la clasificación de los RN según su peso y edad gestacional; la talla permite identificar alguna anomalía ósea; los perímetros corporales ayudan a la valoración neurológica, el crecimiento de tejido adiposo, así como detectar organomegalias displasias o desnutrición.

PROFILAXIS DEL RN

Cloranfenicol y vitamina K

- La profilaxis ocular se utiliza para el tratamiento de infecciones tras el parto como *Neisseria gonorrhoeae* o clamidia.

Dosis

2 gotas cada ojo

- La vitamina K promueve la síntesis hepática de los factores de la coagulación II, VII, IX y X. previniendo hemorragias intracraneales y mejorar los tiempos de coagulación.

1 mg >2000gr
2 mg <2000gr