



Mi Universidad

SUPER NOTA

Nombre del Alumno: Dulce Maria Alvarez López

Nombre del tema: Cuidados inmediatos y mediatos del Recién Nacido.

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer.

Nombre del profesor: María del Carmen López Silva.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería.

Cuatrimestre: 4to

CUIDADOS INMEDIATOS Y MEDIATOS DEL RECIEN NACIDO.

La atención del R/N se representa en el conjunto de intervenciones, cuidados, la niñ(a) en el proceso en el que nace inmediatamente después de nacer.



CUIDADOS INMEDIATOS

Cuidados inmediatos son aquellas maniobras que se le realizan al recién nacido en los primeros 5 minutos de vida intrauterina.

La evaluación óptima de la persona R/N debe incluir 4 valoraciones durante la estancia hospitalaria.

- 1.- Al momento del nacimiento.
- 2.- Aproximadamente a las 8 horas de vida extrauterina .
- 3.- Al cumplir las 12 o 24 horas de vida.
- 4.- Antes del alta o regreso en conjunto con la madre.



PREVENCIÓN DEL SÍNDROME HEMORRÁGICO DEL RN.
A todos los RN se le aplica una inyección intramuscular de 1mg (0.1ml) de vitamina K.



PREVENCIÓN DE LA CONJUNTIVITIS NEONATAL.
A todos los RN se les pone unas gotas de nitrato de plata al 1% para prevenir conjuntivitis.



MEDICIÓN Y REGISTRO DE SIGNOS VITALES AL RN.

La supervisión de estas primeras horas requiere medición cada media hora o cada hora de la temperatura.



SIGNOS VITALES DEL RN.

F/C 120 -160 lpm

F/R 40-60 r/m

TEMPERATURA 35.5-37 °c

ANAL

TEMPERATURA 36.8-37 °c

AXILAR

TENSION ARTERIAL 60/40 mmHg



SOMATOMETRIA DEL RECIEN NACIDO

Los principales datos que precisa conocer son: peso, perímetro y perímetro craneal



Somatometría del R/N.
PESO bajo peso (hipotrófico)

peso adecuado (Eutrófico).

Peso alto (hipertrófico)

Talla

48 a 52 cm


Perímetro cefálico

32 a 36 cm

perímetro torácico

30ª 34 cm.





Control de la temperatura ambiental y ropa. Es más recomendable un ambiente caliente (22-25 °C) que abrigar excesivamente al RN. Las prendas de vestir serán de fácil colocación y holgadas. El neonato se colocará en decúbito lateral o en supino.

BAÑO GENERAL
TAMIZ AUDITIVO
TAMIZ METABOLICO
TAMIZ CARDIACO
VACUNACION
PRUEBAS DE LA VISTA

UDS Antología, Enfermería en el cuidado de la mujer- Licenciatura en Enfermería , Cuarto cuatrimestre 2023.

1. Bustamante, F., Urquidia, C., Florenzano R., Barrueto, C., Hoyose, J., Ampuero, K., Terán, L., Figueroa, M., Farías, M., Livia, M. y Giacamanm, E. (2018).
2. El programa RADAR para la prevención del suicidio en adolescentes de la región de Aysén, Chile: resultados preliminares. Revista Chilena Pediatría, 89(1), 145-148. Doi: 10.4067/S0370-41062018000100145
3. OMS (2014). Prevención del suicidio: un imperativo global. https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf
4. Martínez, C. (2017). Suicidología comunitaria para América Latina. Teoría y experiencias. ALFEPSI
5. UNICEF (2018). Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas (Communication, Childhood and Adolescence). <https://www.unicef.org/argentina/informes/comunicaci%C3%B3n-infancia-y-adolescencia-gu%C3%ADa-para-periodistas>