



Alumna: CRISOLITO GARCIA HERNANDEZ

Profesor: MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

Tema: MANEJO DEL SHOCK

Materia: ENFERMERIA CLINICA 1

4 CUATRIMESTRE LIC.EN ENFERMERIA

(MANEJO DEL SHOCK)

SINTOMAS CLINICOS

Hipotensión arterial.

(Pulso débil, piel fría y húmeda).

Taquicardia.

Alteraciones de la respiración, y el sensorio, cianosis.

Afección crítica causada por la disminución repentina del flujo sanguíneo en todo el cuerpo.

CLASIFICACION

- *cardiogénico
- *hipovolémico
- *estancamiento de la sangre
- *quemaduras

TIPOS DE SHOCK:

Shock hemorragia:

Perdida extravascular de sangre, importante y rápida, disminución del volumen sanguíneo circulante.

Shock hipovolémico no hemorrágico:

Perdida de líquidos vía gastrointestinal (vómito y diarrea) (ascitis)

Shock cardiogénico:

Ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre y oxígeno al cerebro ro y otros órganos vitales.

Shock obstructivo extra cardiaco:

Provocado por el taponamiento cardiaco, la pericarditis constrictiva y pulmonar masivo

Shock séptico:

Afección mortal ocasionada por una infección grave localizada o sistémica.

Shock anafiláctico:

reacción grave mortal del sistema inmunitario a un antígeno.

Shock

Se produce por bloqueo farmacológico del sistema nervioso simpático o por lesión de la medula espinal

FASES DEL SHOCK

Fase de shock compensado: desaparición progresiva de las venas de dorso de mano y pies.

Fase de shock descompensado: Empieza a disminuir el flujo a órganos vitales.

Fases de shock irreversible: Se produce un déficit tisular de oxigeno incluso con aportes aumentados.