



Nombre del Alumno: Ivis Sady García Rodríguez

Nombre del tema: Reanimación Básica

Parcial: I

Nombre de la Materia: Enfermería en Urgencias y Desastres

Nombre del profesor: E. E. C. C. Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 7

Lugar y Fecha de elaboración: La Independencia, Chiapas a 15 de octubre del 2023



REANIMACIÓN BÁSICA

Confirmar la seguridad de la escena



- ❖ La víctima no responde.
- ❖ Pedir ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentren cerca.
- ❖ Activar el sistema de respuesta a emergencias a través de un dispositivo móvil (si corresponde).
- ❖ Obtener un DEA y equipo para emergencias (o enviar a otra persona para que lo traiga).

Respiración normal, hay pulso

Comprobar si la víctima no respira o solo jadea/boquea y comprobar el pulso (al mismo tiempo).

Hay pulso, pero no respira con normalidad

¿se detecta pulso con certeza al cabo de 10 segundos?

Controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia

Sin respiración solo jadea/bloquea; sin pulso

En este punto, en todos los escenarios, se activa el sistema de respuesta a emergencias o la asistencia y se busca un DEA y equipo de emergencias o se pide a alguien que lo traiga

Proporcionar ventilación de rescate:

1 ventilación cada 5 – 6 segundos, o unas 10 – 12 ventilaciones por minuto.

- ✓ Activar el sistema de respuesta de emergencia (si no se ha hecho antes) al cabo de 2 minutos.
- ✓ Continuar con la ventilación de rescate; comprobar el pulso cada 2 minutos aproximadamente. Si no hay pulso. Iniciar la RCP.
- ✓ Si se sospecha la presencia de sobredosis de opiáceos, administrar naloxona si está disponible siguiendo el protocolo

RCP

Iniciar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones.

Utilizar el DEA tan pronto como esté disponible.

Llega el DEA

Comprobar el ritmo.

¿El ritmo es desfibrilable?

Si, es desfibrilable

Administrar una descarga. Reanudar la RCP de inmediato durante aproximadamente 2 minutos (hasta que lo indique el DEA para permitir la compresión del ritmo). Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience

No, no es desfibrilable

Reanudar la RCP de inmediato durante aproximadamente 2 minutos (hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo). Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse.

