



**NOMBRE DEL ALUMNO:** Carlos César López Ramírez

**NOMBRE DEL TEMA:** RCP básico

**NOMBRE DE LA MATERIA:** Enfermería en Urgencias y Desastres

**NOMBRE DEL PROFESOR:** Marcos Jhodany Arguello

**LICENCIATURA:** Enfermería

**CUATRIMESTRE:** Séptimo

**GRUPO:** B

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACION:**

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS A 12 de Octubre del 2023

Confirmar escena segura

- La víctima no responde.
- Pedir ayuda a personas que estén cerca.
- Activar el sistema de emergencia y solicitar un DEA o enviar a una persona que lo traiga.

Respiración normal,  
hay pulso

Hay pulso pero  
no respira  
con normalidad

Controlar hasta que lleguen los animadores de emergencias.

Comprobar si la persona no respira o solo jadea y comprobar el pulso al mismo tiempo.

Proporcionar ventilación de rescate:  
1 ventilación cada 5-6 segundos, o unas 10-12 ventilaciones por minuto.  
- Activar el sistema de emergencias.  
- Continuar con ventilación de rescate; comprobar el pulso cada 2 minutos. si no hay pulso iniciar RCP.  
- si se sospecha la presencia de sobredosis de opiáceos, administrar naloxona si esta disponible siguiendo el protocolo.

Sin respiración o solo jadea/ bloquea; sin pulso

En todos los escenarios se activan el sistema de emergencia, se busca o se solicita un nDEA

Llega el DEA

RCP  
Iniciar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones.  
utilizar el DEA tan pronto este disponible

Si, es desfibrilable

No, no es desfibrilable

Administra 1 descarga. Reanudar RCP de inmediato durante aprox. 2 minutos hasta que el DEA lo indique para permitir la comprobación del ritmo. continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse.

Reanudar RCP de inmediato durante aprox. 2 minutos hasta que el DEA lo indique para permitir la comprobación del ritmo. continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse.