

HIGADO Y VÍAS BILIARES

MATERIA: ANATOMIA Y FISIOLOGIA

DOCENTE: VICTOR MANUEL NERY GONZALEZ

ALUMNA: KARLA GUADALUPE MÉRITO GÓMEZ

LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE. SEGUNDO



HIGADO Y VIAS BILIARES



La vesícula biliar es un pequeño saco muscular de almacenamiento, en forma de pera, que contiene la bilis y que está interconectado con el hígado mediante unos conductos llamados vías biliares.

La bilis es un líquido espeso y viscoso, de color amarillo verdoso.

se compone de sales biliares, electrolitos, pigmentos biliares, colesterol y otras grasas.

Tiene dos funciones principales:


- Ayudar a la digestión
- Eliminar del organismo ciertos productos de desecho principalmente hemoglobina y exceso de colesterol

El hígado es el órgano grande ubicado en la parte superior del abdomen.

Se componen principalmente de células que se llaman hepatocitos. También contienen otros tipos de celulas incluyendo células que cubren sus vasos sanguíneos y las que cubren los conductos pequeños en el hígado que se llaman conductos biliares

¿QUÉ SON LAS VÍAS BILIARES?

Las vías biliares son una red de tubos, llamados conductos, que conectan el hígado, la vesícula biliar y el intestino delgado.



VÍAS BILIARES:

La bilis sale del hígado por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, los cuales se unen para formar el conducto hepático común.


posteriormente este conducto se une a otro que conecta con la vesícula biliar, denominado conducto cístico, para formar el colédoco.


Aproximadamente la mitad de la bilis es secretada entre las comidas, fluye directamente a través del colédoco al intestino delgado.



De ahí desemboca en el intestino delgado a través del esfínter de oddi (un musculo en forma de anillo) situado centímetros por debajo del estómago

La bilis restante es desviada a través del conducto cístico a la vesícula biliar, donde es almacenada. En la vesicular biliar hasta el 90% del agua de la bilis se absorbe hacia el torrente sanguíneo, por lo que la bilis restante se vuelve muy concentrada.





Cuando entran alimentos en el intestino delgado, una serie de señales hormonales y nerviosas desencadenan la contracción de la vesícula biliar, y la relajación y la apertura del esfínter de oddi.

La bilis fluye entonces desde la vesicular biliar hasta el intestino delgado, donde se mezcla con el contenido alimenticio y lleva a cabo sus funciones digestivas.



Despues que la bilis haya recorrido el intestino delagdo, alrededor del 90% de las sales biliares son reabsorvidas en el torrente sanguineo a traves de la pared de la porción distal del intestino delgado

El hígado extrae estas sales biliares de la sangre y la secreta de nuevo a la bilis. Las sales biliares pasan por este ciclo unas 10 o 12 veces al día.

Cada vez más pequeñas cantidades de sales biliares escapan a la absorción y alcanzan al intestino grueso, donde son descompuestas por las bacterias

Algunas sales biliares son reabsorbidas en el intestino grueso y el resto se excreta en las heces.

EL HÍGADO Y LA VESICULA BILIAR

El hígado y la vesícula biliar son dos órganos accesorios del tracto gastrointestinal.

Estos desempeñan un papel multifuncional clave que ayuda en las funciones del aparato digestivo y en la homeostasis.

El hígado consta de varios lóbulos y recibe sangre principalmente de la vena porta hepática.

La vesicula biliar se encuentra al inferior del higado y participa en el almacenamiento y la liberación de bilies en el duodeno.







REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. ANTOLOGÍA

http://www.infocancer.org.mx/?t=estructura-organo-higado#:~:text=El%20h%C3%ADgado%20est%C3%A1%20compuesto%20principalmente,que%20se%20llaman%20conductos%20biliares

https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/higado-y-vesicula-biliar

<u>paradigmia.com/curso/anatomia-humana/modulos/visceras-digestivas-abd</u>