

Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: BRYAN ELI GARCIA ZAMORANO

TEMA: MAPA CONCEPTUAL

PARCIAL: 4

MATERIA: ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA

NOMBRE DEL PROFESOR: RUBEN EDUARDO DOMINGUEZ GARCIA


LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE: 5

EL ENFERMO ONCOLÓGICO

Cuidados de Enfermería al paciente con quimioterapia

Los cuidados de enfermería que estos pacientes precisan, van siempre relacionados con los efectos secundarios originados por el tratamiento.



Cuidados de Enfermería al paciente con dolor

Técnicas de distracción

Respiración lenta y rítmica: Animar al paciente a concentrarse en la sensación de respirar lenta y rítmicamente, evocando una imagen tranquila.
 Masaje: Enseñar al paciente a masajearse en una zona dolorosa con movimientos circulares o frotado suavemente.
 Música: Animar al paciente que escuche y se centre en su música favorita, siguiendo el ritmo y letra.

Administración de analgésicos

Modificar la percepción y la interpretación del dolor a través de la depuración del sistema nervioso central. Son eficaces siempre que se administran antes de que el cliente manifieste el dolor. Por lo tanto, fundamental demostrarlo y recibirlo regularmente. La enfermera deberá evaluar los efectos secundarios, efectos colaterales y riesgos antes de administrarlos.

Analgésico controlado por el paciente (PCA)

Es un método de tratamiento del dolor que permite al paciente tomar parte activa en el tratamiento de su dolor. El tipo y la dosis de analgésico necesaria para el control del dolor varían dependiendo del paciente.

El enfermo en estado de shock

SHOCK CARDIOGÉNICO

Ocurre cuando el corazón ha resultado tan dañado que es incapaz de suministrar suficiente sangre oxigenada a los órganos del cuerpo.

CAUSAS

El shock cardiogénico ocurre cuando el corazón incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre que el cuerpo necesita. Las causas más comunes son complicaciones cardíacas de otros muchos de los cuales ocurren durante o después de un ataque cardíaco (infarto o miocardiopatía).

SHOCK HIPOVOLEMICO

Un shock hipovolémico es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar.

SHOCK ANAFILACTICO

Es un tipo de reacción alérgica potencialmente mortal. Causas: La anafilaxia es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo de tipo químico que se ha cometido en el organismo. Se libera una sustancia que puede ocasionar una reacción alérgica.

