



Nombre del alumno:

Yarix Karina Escobar González

Nombre del profesor:

Lic. Rubén Eduardo Domínguez García

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual unidad IV

Materia:

Enfermería medico quirúrgica

Grado:

Quinto cuatrimestre

Licenciatura en Enfermería

Frontera Comalapa, Chiapas a 07 de Abril del 2024

Cuidados de Enfermería al paciente con quimioterapia.

Es

Los cuidados de enfermería que estos pacientes precisan, van siempre relacionados con los efectos secundarios originados por el tratamiento

Nauseas

Son

- Informar de su aparición, suele ser a las 2-3 horas de la administración de la quimioterapia y pueden durar hasta 72 horas.
- Disminuir la ansiedad.
- Administrar antieméticos antes, durante y después del tratamiento (por prescripción facultativa).
- Después de administrar el citostático se pueden dar al paciente bebidas de cola, tostadas o galletas saladas y progresivamente pequeñas cantidades de alimentos, según tolerancia.

Vómitos

Los cuidados de enfermería

- Pueden ser agudos (primeras 24 horas, siendo muy intensos), anticipatorios (antes de la quimioterapia) y retardados (aparecen después de las primeras 24 horas).
- Vigilar la deshidratación.
- Tratamiento antiemético (por prescripción facultativa).
- Vigilar sobre la persistencia de vómitos severos, dolor o sangrado o cualquier otra anomalía y registrarlo en la hoja de enfermería.
- Desaconsejar comidas pesadas.
- Evitar cocinar.

Estreñimiento

Los cuidados de enfermería


- Suele aparecer entre los 5-8 días siguientes al tratamiento.
- Algunos citostáticos pueden causar estreñimiento, causando un trastorno de la motilidad intestinal.
- Recomendar al paciente que tome alimentos ricos en fibra y residuos, para facilitar el tránsito intestinal (fruta con piel, verdura, cereal integral, ciruelas, higos...).
- Aconsejar al paciente que realice ejercicio (paseos).
- Ocasionalmente puede ser necesario el uso de laxantes, micro enemas o enemas (por prescripción facultativa).

Alopecia


Los cuidados de enfermería

- Se trata de un efecto frecuente que varía en función del tipo de tratamiento quimioterápico utilizado. Ocurre por la rápida frecuencia de división de las células del folículo piloso.
- Informar al enfermo, antes del inicio, de la caída del cabello. Instruirle de los efectos de la quimioterapia.
- Intentar conocer el impacto de la alopecia en el paciente, ya que en muchos casos provocará un estrés psicológico.
- La pérdida del cabello será gradual, evidente a las 2-3 semanas de comienzo del tratamiento.

Cuidados de Enfermería al paciente con dolor



EL ENFERMO ONCOLÓGICO



EL ENFERMO ONCOLÓGICO

