



Mi Universidad

Súper nota.

Nombre del Alumno: Leydi Laura Cruz Hernández

Nombre del tema: Aborto

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Patología del niño y adolescente.

Nombre del profesor: Victor Manuel Nery González

Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería.

Cuatrimestre: 5 cuatrimestre

ABORTO

Etiología.

Aborto espontáneo

Es la pérdida espontánea de un feto antes de la semana 20 del embarazo. La pérdida del embarazo después de 20 semanas se llama muerte fetal. Un aborto espontáneo es un suceso que ocurre naturalmente, a diferencia de los abortos médicos o abortos quirúrgicos.



Antes de la semana 20

< 500g



Inferior a 500 gramos



Un aborto espontáneo también se puede denominar "aborto natural". Otros términos para referirse a una pérdida temprana en el embarazo son:

• Aborto consumado: todos los productos (tejidos) de la concepción salen del cuerpo.

• Aborto incompleto: solo algunos de los productos de la concepción salen del cuerpo.


• Aborto inevitable: no se pueden detener los síntomas y se presenta el aborto espontáneo.



Aborto completo



Aborto incompleto



Aborto inevitable

• Aborto infectado (séptico): el revestimiento del vientre (útero) y cualquier producto restante de la concepción resultan infectados.



• Aborto retenido: el embarazo falló y los productos de la concepción no salen del cuerpo.



Aborto retenido

Los síntomas de esta afección son cólicos abdominales con o sin sangrado vaginal. Son un signo de que se puede presentar un aborto espontáneo.



Sangrado vaginal



Cólicos abdominales



Dolor lumbar



Reducción síntomas embarazo

Causas fetales



Fallos cromosómicos

La mayoría de los abortos espontáneos son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé. En pocas ocasiones, estos problemas tienen relación con los genes del padre o de la madre.

Otras causas posibles de aborto espontáneo son:

- Drogadicción y alcoholismo
- Trastornos de la coagulación
- Exposición a toxinas ambientales
- Problemas hormonales
- Infección
- Sobrepeso
- Problemas físicos de los órganos reproductores de la madre
- Problemas con la respuesta inmunitaria del cuerpo
- Enfermedades graves en todo el cuerpo (sistémicas) de la madre (como la diabetes no controlada)
- Tabaquismo



Sangrado abundante



Dolor pélvico o abdominal



Infección de orina




Infección vaginal



Sangrado vaginal leve



Dolor abdominal



El riesgo de aborto espontáneo es más alto:

- En mujeres de mayor edad. El riesgo se incrementa después de los 30 años, se vuelve mucho más grave entre los 35 a los 40 años, y es mayor después de los 40 años.
- En mujeres que ya hayan tenido uno o más abortos espontáneos.