



Mi Universidad

SUPERNOTA

NOMBRE DEL ALUMNO: MARISOL LÓPEZ ORDOÑEZ

NOMBRE DEL TEMA: ABORTO

PARCIAL: 3

NOMBRE DE LA MATERIA: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

NOMBRE DEL PROFESOR: VÍCTOR MANUEL NERY GONZÁLEZ

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE: 5

ABORTO, ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

El aborto espontáneo es la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de edad de gestación. Un aborto espontáneo también es la pérdida de un feto con un peso inferior de 500 gramos. Amenaza de aborto es el sangrado vaginal sin dilatación cervical antes de las 20 semanas de gestación de un embarazo intrauterino confirmado variable. El diagnóstico se realiza por examen pélvico, mediante la medición de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana. En general, el tratamiento es la conducta expectante para la amenaza de aborto, y, si se produce el aborto espontáneo o este parece inevitable, la observación o la evacuación del útero.

ETIOLOGÍA DEL ABORTO ESPONTÁNEO.

El aborto espontáneo temprano es causado por anomalías cromosómicas. Las anomalías del tracto reproductivo materno (útero bicornal, fibromas, adherencias) también pueden causar pérdida del embarazo hasta las 20 semanas de gestación. Los abortos espontáneos aislados pueden producirse por ciertas virosis (citomegalovirus, herpes virus, parvovirus y rubeola). Otras causas incluyen anomalías inmunológicas y traumatismos mayores.



LOS FACTORES DE RIESGO PARA EL ABORTO ESPONTÁNEO:

- + Edad >35
- + Antecedentes de aborto espontáneo
- + Tabaquismo
- + Consumo de drogas
- + Consumo de alcohol
- + Un trastorno crónico mal controlado (diabetes, hipertensión, trastornos evidentes de la tiroides) en la madre.



CLASIFICACIÓN DEL ABORTO	
TIPO	DEFINICIÓN
Temprano	Aborto antes de las 12 semanas de gestación
Tardía	Aborto entre las 12 y las 20 semanas de gestación
Espontáneo	Pérdida de embarazo antes de las 20 semanas de edad gestacional
Inducido	Terminación del embarazo

Amenaza de aborto	Sangrado vaginal antes de las 20 semanas de gestación sin dilatación cervical
Inevitable	Sangrado vaginal o rotura de membranas de las 20 semanas de edad gestacional acompañada de dilatación del cuello uterino
Incompleto	Dilatación del cuello y expulsión de algunos productos de la concepción
Completo	Cuello uterino cerrado después de la expulsión de todos los productos de la concepción
Retenido	Muerte de un embrión o un feto que no es expulsado y que no produce sangrado o dilatación cervical (también llamado huevo muerto y retenido, feto muerto, embarazo anembrionario o pérdida embrionaria intrauterina)
Recurrente o habitual	≥ 2 a 3 abortos espontáneos
Séptico	Infección grave de los contenidos uterinos durante o poco antes o después de un aborto.

SÍNTOMAS.

Complicaciones.

Los signos y síntomas del aborto espontáneo:

- ✚ Manchado o sangrado vaginal
- ✚ Dolor o calambre en el abdomen o en la región lumbar
- ✚ Líquido o tejido que sale de la vagina

Algunas mujeres que tienen un aborto espontáneo desarrollan una infección en el útero. A esto se le llama aborto espontáneo séptico. Los signos y síntomas de esta infección son:

- ✚ Fiebre
- ✚ Escalofríos
- ✚ Sensibilidad en la parte baja del abdomen
- ✚ Secreción vaginal con mal olor



PREVENCIÓN.

- ✚ Acude con regularidad a las consultas de atención prenatal
- ✚ Evita los factores de riesgo conocidos del aborto espontáneo como fumar, beber alcohol, y consumir drogas
- ✚ Tomar un complejo multivitamínico diario
- ✚ Limitar el consumo de cafeína



Referencias bibliograficas.

- <https://www.msmanuals.com/es/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/anomal%C3%ADas-del-embarazo/aborto-espont%C3%A1neo>
- <https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/multimedia/table/clasificaci%C3%B3n-del-aborto>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/symptoms-causes/syc-20354298>
- <https://www.reproduccionasistida.org/aborto-espontaneo/>