



Mi Universidad

Super Nota

Nombre del Alumno: Densee Lineth Bautista Peralta.

Nombre del tema: Aborto.

Parcial: 3er.

Nombre de la Materia: Ginecología Y Obstetricia.

Nombre del profesor: Víctor Manuel Nery González.



Nombre de la Licenciatura: Enfermería.

Cuatrimestre: 5to.

ABORTO

¿QUE ES UN ABORTO?

Es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto antes de los cinco meses de embarazo, esto puede ser espontáneo o provocado.



ETIOLOGÍA

puede ser por muchos factores, factores como factores genéticos, anatómicos, endocrinos, infecciosos, inmunológicos, ambientales y psicosociales.

Causa genética: están asociados a la falta o al exceso de cromosomas. Los problemas cromosómicos son el resultado de errores que ocurren por azar a medida que el embrión se divide y crece, no de problemas hereditarios.

Infecciones: bacterias como *Mycoplasma hominis* y *ureaplasma urealyticum*, infecciones parasitarias como toxoplasmosis e infecciones por virus como herpes, citomegalovirus y rubéola, son algunas causas

Endocrinopatías: La diabetes mellitus, los distiroidismos y la deficiencia de progesterona o fase lútea insuficiente y síndrome de ovario poliquístico son las causas más frecuentes.

Anatómicas: Malformaciones del útero, como el útero septado o el útero bicorne, que pueden dificultar el desarrollo del embarazo.

Causas fetales



Fallos cromosómicos


Causas maternas



Alteraciones cavidad uterina Enfermedades autoinmunes

SÍNTOMAS

- sangrado vaginal
- Dolor o calambre en el abdomen o en la región lumbar
- Líquido o tejido que sale de la vagina
- fiebre



Sangrado vaginal abundante



Dolores intensos



Fiebre



Debilidad

FACTORES DE RIEGO

- Edad materna avanzada
- Tabaquismo
- Consumir más de dos vasos dealcoholpor día
- Consumir drogas ilícitas(drogas recreativas)
- Exposición a algunas toxinas ambientales
- Infecciones, por ejemplo porcitomegalovirus(CMV) yVIH
- Enfermedad crónica de la madre, por ejemplo, enfermedades autoinmunes comolupusydiabetes insulino dependientecon concentraciones de azúcar en sangre no controladas
- Dosis altas deradioterapiaen el útero, los ovarios o la glándula pituitaria durante el tratamiento de un cáncer infantil

Si tuvo un aborto la primera vez que estuvo embarazada, puede correr más riesgo de sufrir complicaciones durante su próximo embarazo. Dichas complicaciones incluyen:

- Pre-eclampsia
- Amenaza de aborto
- Labor de parto inducida
- Parto pretérmino
- Bajo peso al nacer
- Hemorragia postparto

ABORTO

COMPLICACIONES

Es la terminación de un embarazo. Es la muerte y exfoliación: Cuando se realiza un procedimiento quirúrgico, aunque el instrumental es esterilizado, pueden viajar bacterias al útero y causar infecciones. También si se utilizan pastillas para abortar, pueden quedar algunos restos de tejido de la placenta que causen una infección.

Síntomas de infección por aborto

Los síntomas más comunes de una infección por aborto son:

- Fiebre
 - Dolor en el vientre
 - Mal olor vaginal
 - Flujo vaginal
- ulsión del feto antes de los cinco meses de embarazo, esto puede ser espontáneo o provocado.




CLASIFICACIONES

DEL ABORTO

ABORTO ESPONTÁNEO

- Aborto espontáneo inevitable: tienes sangrado que aumenta y tu cuello uterino se abre.
- Aborto espontáneo incompleto: parte del tejido del embarazo sale de tu útero y parte queda dentro.
- Aborto espontáneo completo: todo el tejido del embarazo sale de tu útero.
- Aborto espontáneo retenido: no tienes ni cólicos ni sangrado, pero el ultrasonido muestra un embrión sin actividad cardíaca o un saco gestacional vacío, es decir, sin el embrión.



ABORTO INDUCIDO

- Interrupción voluntaria del embarazo : se realiza tras libre elección de la embarazada hasta la semana 14 de gestación.
- Aborto terapéutico: se realiza por razones médicas.


ABORTO FARMACOLÓGICO

- consiste en la administración de la píldora abortiva. Por lo general, este se emplea antes de la semana 7 de gestación.



ABORTO QUIRÚRGICO

- Son procesos instrumentales que pueden requerir de anestesia o sedación, control ecográfico y los cuidados posteriores que amerite cada procedimiento.



- Antes de las 14 semanas (bajo riesgo) se realiza mediante aspiración con cánulas específicas previa dilatación cervical.
- A partir de la semana 14 (alto riesgo) y hasta la semana 20, el procedimiento suele ser por dilatación del cuello uterino y evacuación, usando material quirúrgico para vaciar el útero de todo el producto del embarazo (líquido amniótico, placenta y restos fetales)

BIBLIOGRAFÍAS

<https://clinicaisadora.es/abortar-en-madrid/tipos/>

<https://www.binasss.sa.cr/poblacion/aborto.htm#:~:text=teniendo%20en%20cuenta%20las%20causas,Aborto%20terap%C3%A9utico>

<https://www.ile.mx/riesgos-y-consecuencias-del-aborto/>

[https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/symptoms-causes/syc-](https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/symptoms-causes/syc-20354298#:~:text=La%20mayor%C3%ADa%20de%20los%20abortos%20espont%C3%A1neos%20ocurren%20antes%20de%20la,%20en%20la%20regi%C3%B3n%20lumbar)

[20354298#:~:text=La%20mayor%C3%ADa%20de%20los%20abortos%20espont%C3%A1neos%20ocurren%20antes%20de%20la,%20en%20la%20regi%C3%B3n%20lumbar](https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/symptoms-causes/syc-20354298#:~:text=La%20mayor%C3%ADa%20de%20los%20abortos%20espont%C3%A1neos%20ocurren%20antes%20de%20la,%20en%20la%20regi%C3%B3n%20lumbar)

<https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/anomal%C3%ADas-del-embarazo/aborto-espont%C3%A1neo>