



**Mi Universidad**

## **SUPERNOTA**

Nombre del Alumno: Gumaro Antonio Osorio Delfín

Nombre del tema: Etiología y clasificación del aborto

Parcial: 3er. parcial

Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia

Nombre del profesor: Víctor Manuel Nery González


Nombre de la Licenciatura: Enfermería.

Cuatrimestre: 5° Cuatrimestre

# ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DEL ABORTO

## CONCEPTO


Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto antes de los cinco meses de embarazo. Después de esta fecha, y hasta las 28 semanas de embarazo se llama parto inmaduro y parto prematuro si tiene más de 28 semanas. Se dice que hay aborto completo cuando se expulsa con el feto la placenta y las membranas. Hay retención placentaria cuando se expulsa solamente el feto y se dice que hay restos uterinos cuando sólo se expulsa una parte del producto de la concepción.



## ETIOLOGÍA

El aborto espontáneo temprano a menudo es causado por anomalías cromosómicas. Las anomalías del tracto reproductivo materno (p. ej., útero bicorne, fibromas, adherencias) también pueden causar pérdida del embarazo hasta las 20 semanas de gestación. Los abortos espontáneos aislados pueden producirse por ciertas virosis (citomegalovirus, herpesvirus, parvovirus y rubéola). Otras causas incluyen anomalías inmunológicas y traumatismos mayores. Con mayor frecuencia, se desconoce la causa.

Amenaza de aborto espontáneo



Sangrado vaginal

ADAM.

## CLASIFICACIÓN

La muerte fetal y el parto prematuro se clasifican como sigue:

- Aborto espontáneo: muerte del feto, a veces con salida de los productos de la concepción (feto y placenta) antes de las 20 semanas de la gestación
- Muerte fetal (defunción fetal): muerte fetal después  $\geq 20$  semanas
- Parto pretérmino: nacimiento de un feto vivo entre las 20 y las 36 semanas/6 días



Aborto completo

Aborto incompleto

Aborto retenido

## CAUSAS POSIBLES

- Problemas con los genes o los cromosomas:

La mayoría de los abortos espontáneos ocurren porque el feto no se desarrolla como debería. Alrededor del 50 % de los abortos espontáneos están asociados a la falta o al exceso de cromosomas.

- Afecciones de salud materna:

En algunos casos, si la madre tiene una enfermedad, esta podría provocar un aborto espontáneo. Entre los ejemplos se incluyen los siguientes:

- Diabetes no controlada
- Infecciones.
- Problemas hormonales.
- Problemas del útero o del cuello del útero.
- Enfermedad de la tiroides.

## TRATAMIENTO

Para la amenaza de aborto, el tratamiento es expectante, pero los profesionales de la salud pueden evaluar periódicamente los síntomas de la mujer o hacer una ecografía. No hay evidencia que sugiera que el reposo en cama disminuya el riesgo de aborto completo posterior.

Para los abortos inevitables, incompletos o retenidos, el tratamiento es la evacuación uterina o la espera hasta la eliminación espontánea de los productos de la concepción.



# ABORTO INDUCIDO

Los métodos comunes para inducir el aborto son

- Evacuación instrumental del útero después de la dilatación cervical.
- Inducción médica (fármacos para la estimulación de las contracciones uterinas).

El método utilizado depende en parte de la edad gestacional. La evacuación instrumental se puede utilizar en la mayoría de los embarazos. Se pueden usar fármacos en algunos embarazos < 11 o > 15 semanas. El aborto con medicamentos realizado antes de las 11 semanas puede realizarse en forma ambulatoria. Las pacientes que se someten a un aborto con medicamentos después de las 11 semanas deben ser observadas porque puede ocurrir un sangrado abundante.

La cirugía uterina (histerotomía o histerectomía) es un último recurso, que generalmente se evita y se asocia con tasas de mortalidad más altas. La histerotomía produce cicatrices uterinas, que pueden romper el útero en embarazos posteriores.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- <https://www.binasss.sa.cr/poblacion/aborto.htm>
- <https://www.msmanuals.com/es/professional/ginecolog%3%ADa-y-obstetricia/anomal%3%ADas-del-embarazo/aborto-espont%3%AIneo>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/symptoms-causes/syc-20354298>

