



Mi Universidad

CUADRO SINOPTICO.

Nombre del Alumno KARLA LUCIA CONTRERAS ALEGRIA

Nombre del tema CUIDADOS GENERALES EN EL RECIEN NACIDO A TERMINO

Parcial II

Nombre de la Materia GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Nombre del profesor VICTOR MANUEL NERY GONZALES

Nombre de la Licenciatura ENFERMERIA

Cuatrimestre QUINTO

CUIDADOS GENERALES DEL RECIEN NACIDO A TERMINO.

¿QUE SON?

Atención de rutina y observación del recién nacido a término.

Recién nacido a término: niño que ha logrado todos sus procesos de maduración pulmonar, gastrointestinal y de sus sistemas, se considera que esta listo para interactuar con su medio exterior.

¿CUALES SON?

Cuidado del cordón umbilical.

Esta destinado a reducir el riesgo de onfalitis, hay que mantener limpio y seco el muñón umbilical.

Cuidado del peso.

La mayoría de los recién nacidos pierden el 5 o 7 % de pesos en los primeros días de nacidos.

Cuidado micciones y deposiciones.

La mayoría de los recién nacidos orinan durante las primeras 24 horas de vida.

Cuidado de meconio.

Si el neonato no elimina meconio en 24 horas debe buscarse anomalías anatómicas.

APGAR

Valora la vitalidad del recién nacido los primeros 5 minutos de vida.

Apariencia: color de la piel.

Escala de 0 a 2, la puntuación total varia de 0 a 10.

Pulso: frecuencia cardiaca.

De 7-10 optimo, de 4-6 dificultad moderada de 1-3 dificultad grave.

Gestos: reflejos del bebe.

Actividad: tono muscular.

Respiración: respiración.

SILVERMAN

Evalúa la dificultad respiratoria del recién nacido.

Se utiliza principalmente en bebés prematuros o que puedan tener dificultad respiratoria.

De 7-10 dificultad respiratoria grave, de 4-6 dificultad respiratoria moderada, de 1-3 dificultad respiratoria leve, 0 sin dificultad respiratoria.

Aleteo nasal: si no llega suficiente aire a los pulmones y en un intento por cambiar eso las fosas nasales tienden a abrirse durante la inspiración.

Quejido respiratorio: sonido característico que produce el aire al ser expulsado a través de una vía aérea estrecha.

Tiraje intercostal: formación de pliegues entre las costillas durante la inspiración.

Retracción xifoidea: cuando los músculos de la respiración hacen un esfuerzo importante o no se coordinan adecuadamente, el apéndice xifoideo comienza a presentar movimientos visibles.

Disociación toracoabdominal: los movimientos toraco abdominales no son armónicos y coherentes, (el tórax se expande mientras se contrae el abdomen y viceversa).

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA.

[¿Qué es un recién nacido a término? | Johnson's® Baby \(johnsonsbaby.com.mx\)](https://johnsonsbaby.com.mx)

[Cuidados del recién nacido normal - Pediatría - Manual MSD versión para profesionales \(msdmanuals.com\)](https://msdmanuals.com)

[Test de Apgar: cómo se valora, puntuación y parámetros \(roams.es\)](https://roams.es)

ANTOLOGIA UDS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA I

[Test de Silverman- Anderson - Enfermera Pediatra®](#)