



## **Mi Universidad**

NOMBRE DEL ALUMNO: LUZ ELENA ORAMAS ESTEFANO

NOMBRE DEL TEMA: CLASIFICACION Y ETIOLOGIA DEL  
ABORTO

PARCIAL: 3 PARCIAL

NOMBRE DE LA MATERIA: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NOMBRE DEL PROFESOR: VICTIR MANUEL NERY  
GONZALES

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: LIC. EN ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE: 5TO CUATRIMESTRE

# CLASIFICACION Y ETIOLOGIA DEL ABORTO

## DEFINICION

El aborto es la pérdida del embarazo "en un momento en el que el feto o embrión no es viable, es decir, que no es capaz de sobrevivir fuera del útero materno"



## ETIOLOGIA

La etiología del aborto puede ser variada dependiendo del tipo o clasificación del aborto. Puede ser por factores genéticos, anatómicos, endocrinos, infecciosos, ambientales y psicosociales

## CLASIFICACION — GENERAL DEL — ABORTO

Temprano	Aborto antes de las 12 semanas de gestación
Tardía	Aborto entre las 12 y las 20 semanas de gestación
Espontáneo	Pérdida de embarazo antes de las 20 semanas de edad gestacional
Inducido	Terminación del embarazo
Amenaza de aborto	Sangrado vaginal antes de las 20 semanas de gestación sin dilatación cervical
Inevitable	Sangrado vaginal o rotura de membranas antes de las 20 semanas de edad gestacional acompañada de dilatación del cuello uterino
Incompleto	Dilatación del cuello uterino y expulsión de algunos productos de la concepción
Completo	Cuello uterino cerrado después de la expulsión de todos los productos de la concepción
Retenido	Muerte de un embrión o un feto que no es expulsado y que no produce sangrado o dilatación cervical (también llamado huevo muerto y retenido, feto muerto, embarazo anembrionado o pérdida embrionaria intrauterina)
Recurrente o habitual	≥ 2 a 3 abortos espontáneos
Séptico	Infección grave de los contenidos uterinos durante o poco antes o después de un aborto

## TIPOS - DE - ABORTO

### Espontaneo

El aborto espontáneo es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre. Generalmente ocurre durante las 12 primeras semanas de gestación y no precisa de ningún tipo de intervención quirúrgica, pero a partir de la semana 20 pasa a denominarse muerte fetal.

### Inducido

El aborto inducido es la interrupción del embarazo que se realiza de forma **premeditada y requiere de expertos** en dicho procedimiento. De lo contrario, la paciente puede exponerse a **infecciones o procesos sépticos**. La terminación del embarazo es provocada por el uso de medicamentos o de instrumentos que producen la expulsión del embarazo

### Metodos

#### Aborto farmacológico

Consiste en la administración de la **píldora abortiva** (RU-486).

#### Aborto Quirúrgico

Son procesos instrumentales que pueden requerir de anestesia o sedación, control ecográfico y los cuidados posteriores que amerite cada procedimiento

## MANEJO - DEL - ABORTO

Una vez el aborto se ha llevado a cabo, se suele realizar un examen del útero adicional para determinar si queda tejido fetal en el útero. También se estudia si los restos expulsados correspondían a un feto o a una mola hidatiforme, una masa de células que son el resultado de un óvulo no desarrollado correctamente. En caso de que queden restos, se recurre a un legrado.

En cuanto a los problemas que tiene la mujer tras el aborto, Fernández señala que "en los abortos muy precoces, no suele afectar mucho físicamente a la mujer, salvo algún sangrado o molestia abdominal que se resuelven rápidamente. Cuando es tardío puede afectar más y si hace falta realizar un legrado, puede haber complicaciones derivadas de esta técnica".

Al cabo de las tres o cuatro semanas de haber sufrido un aborto, el **ciclo menstrual** vuelve a la normalidad.

## SIGNOS - DE - ALARMA

- Dolor de espalda, de intensidad leve a aguda (algo similar a los calambres menstruales).
- Secreción vaginal espesa, blanca y rosada.
- Contracciones que pueden ser muy dolorosas (en intervalos de 5-20 minutos).
- Pérdida de peso
- Sangrados de color marrón o rojo, acompañados de calambres
- Pérdidas similares a la menstruación, con sangre muy oscura.
- Disminución repentina de los síntomas del embarazo
- Dolor abdominal, muy similar al que se produce durante la menstruación.
- Vómito
- Fiebre, desmayos y debilidad generalizada.

# Referencias bibliográficas

1. <https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/embarazo/diccionario/aborto.html>
2. <https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/anomal%C3%ADas-del-embarazo/aborto-espont%C3%A1neo>
3. <https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/aborto-etiologia-tipologia-geografia-y-desarrollo-mexico/aborto-etiologia-tipologia-geografia-y-desarrollo-mexico.pdf>
4. <https://www.significados.com/aborto/>
5. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/abortion#:~:text=El%20aborto%20es%20un%20procedimiento%20m%C3%A9dico%20habitual.%20Es,cada%20diez%20embarazos%20no%20deseados%20se%20interrumpen%20voluntariamente.>
6. <https://definicion.de/aborto-inducido/#:~:text=Definici%C3%B3n%20de%20Aborto%20inducido%20El%20aborto%20inducido%20es,vital%20del%20embri%C3%B3n%20o%20feto%20para%20su%20eliminaci%C3%B3n.>
7. <https://clinciasadora.es/abortar-en-madrid/tipos/#:~:text=A%20su%20vez%20C%20puede%20subdividirse,la%20madre%20o%20del%20feto>
8. [https://espanol.babycenter.com/blog/vida\\_y\\_hogar/10-senales-de-una-amenaza-de-aborto](https://espanol.babycenter.com/blog/vida_y_hogar/10-senales-de-una-amenaza-de-aborto)