

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TAPACHULA**

**LICENCIATURA EN MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

**MATERIA: PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE OVINOS Y CAPRINOS**

**CATEDRÁTICO: MVZ. SERGIO
CHONG VELÁZQUEZ**

**TRABAJO: SUPER NOTA SOBRE
PARATUBERCULOSIS**

**ALUMNO: DANIEL AMÍLCAR
GARCÍA TRINIDAD**

5TO CUATRIMESTRE GRUPO "A"

**TAPACHULA CHIAPAS A 06 DE ABRIL
DE 2024**



PARATUBERCULOSIS

DEFINICIÓN

La paratuberculosis (PTBC) o también llamada enfermedad de Johne, es una enfermedad infecciosa crónica causada por *Mycobacterium avium* subespecie paratuberculosis (Map) y se caracteriza por ser una enteritis granulomatosa crónica e infecciosa que afecta principalmente a rumiantes. Produce en el animal afectado una emaciación progresiva y una diarrea cada vez más grave. La paratuberculosis también ha sido diagnosticada en un amplio rango de rumiantes silvestres y domésticos.



FUENTES DE INFECCION

Ingestión de alimentos y agua contaminada con material fecal, leche o calostro contaminado. Especies susceptibles: Las especies rumiantes son los huéspedes naturales y los más afectados por Map, así como los camélidos.

ESPECIES SUSCEPTIBLES

Las especies rumiantes son los huéspedes naturales y los más afectados por Map, así como los camélidos.

TRANSMISIÓN

La bacteria es eliminada profusamente durante la fase clínica, contamina praderas e instalaciones ganaderas, siendo muy resistente a condiciones ambientales y a desinfectantes suaves. Las principales formas de adquirir esta enfermedad son a través de la ingestión de materia fecal, leche o calostro contaminados con la bacteria, siendo la forma más común la ingestión de fecas de animales infectados.



SIGNOLOGIA

En los pequeños rumiantes (ovejas y cabras) solo un 10-20% de los casos clínicos presenta diarrea, siendo la pérdida crónica de peso el síntoma característico. En estos casos, si no se lleva a cabo una identificación exhaustiva esta sintomatología se asocia a enfermedades parasitarias. En ovinos, la enfermedad es clínicamente caracterizada por la pérdida progresiva de peso, heces sueltas y a veces diarrea intermitente, que puede ocurrir a partir de 2 años de edad, la mayoría de los animales con la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA

INFORMACIÓN SACADA DE LA CLASE
IMPARTIDA POR EL MVZ. SERGIO CHONG
VELÁZQUEZ

