



Nombre del catedrático: Medico Sergio Chong

Nombre de alumna: Vania Martínez López

Materia: Patología de ovinos

Cuatrimestre: 5B

Fecha: 14 de febrero del 2024

Bibliografía


Diapositivas de clase

colibacilosis

¿Que es?

Es una infección, localizada o generalizada, que se puede presentar en corderos de uno a 14 días de edad, pero afecta con mayor frecuencia a corderos entre dos y seis semanas de edad.

Se caracteriza por su presentación aguda o sobreaguda y los corderos afectados pueden presentar o no diarrea




SIGNOS

afecta corderos de 2 a 8 días de edad, diarrea

profusa, deshidratación y depresión

Algunos animales pueden desarrollar una colisepticemia terminal, sin embargo la causa de la muerte generalmente está asociada con la deshidratación



Dx

se hace por medio del laboratorio, para lo cual se deben remitir muestras de materia fecal para su procesamiento a través de técnicas coproparasitoscópicas



PROFILAXIS

detectar aquellas condiciones (de instalaciones, manejo, etcétera) que estén favoreciendo y aplicar las medidas correctivas. Asimismo es conveniente aplicar el tratamiento individual con coccidicidas a aquellos animales que manifiesten signos de enfermedad. En caso de los animales en engorda intensiva, es de utilidad la administración continua de coccidiostatos el alimento



TX

lasalocida, amprolio, salinomicina y toltrazuril, Sulfas solas (sulfametazina, sulfadimidina, sulfaguanidina y sulfaquinoxalina sódica); sulfas combinadas (trisulfas: sulfametazina, sulfadiazina y sulfameracina); sulfas con trimetoprim; y nitrofuranos (nitrofurazona y furoxona)

