



5to Cuatrimestre Grupo B

Asignatura:

**Patología y técnicas quirúrgicas de ovinos
y caprinos**

Docente:

M.V.Z: Sergio Chong Velazquez

Tema:

Complejo clostridial (Cuadro sinoptico)

Alumno:

Margarita Concepción Martínez Trujillo

Fecha:

Sábado 20 de enero del 2024

Complejo clostridial

Que es?

Las enfermedades clostridiales son producidas por organismos microscópicos llamados "Clostridios" que estan en el medio ambiente.

Que son las enfermedades

Las enfermedades clostridiales son de curso muy rápido y ocurren generalmente en forma de brotes, casi imposible de controlar, matando un gran número de animales en cada evento.

Prevencion

Hay que implementar un plan de vacunación para lograr una buena protección en corderos/as y borregos/as y el mantenimiento de esa protección en los adultos. La vacuna se aplica en la cara interna del cuarto y debe seguirse el siguiente esquema de vacunación:

Gangrena Gaseosa (conocida como "Mancha").

Aparece entre las 24 y 48 horas después de algún trabajo con los animales, donde se hayan producido heridas como en el descole, castración o esquila o después de la inyección de algún producto veterinario con jeringas y agujas sin desinfectar.

Los animales están decaídos, renean y se retrasan del resto si hacemos mover el lote. En el lugar de la herida de la inyección, se podrá notar una zona caliente y la carne color negra y si apretamos puede que cruja.

Enterotoxemia

Se produce tras un cambio brusco en la alimentación del animal, generalmente al pasar de una alimentación pobre a una de mejor calidad como un mallín en rebrote o suplementación con granos.

Los animales enfermos caen al piso, hacen movimientos de pedaleo, pueden arrojar espuma por la boca y mueren. Si se abre el animal puede verse el intestino lleno de gas y con algunas porciones enrojecidas.

Tétanos

La enfermedad aparece en corderos en los días posteriores a la señalada descole y castración, por infección de las heridas.

Los animales afectados tienen dificultad para caminar, se van quedando duros, caen al piso y mueren con manos y patas extendidas.

Hepatitis Infecciosa Necrosante

La enfermedad se produce en animales parasitados con Saguaype o con la Tenia del hígado.

Los animales enfermos quedan rezagados de la majada, se echan o caen al piso y mueren rápidamente. La parte blanca del ojo puede estar amarillenta al igual que la grasa si se abre un animal muerto.

Esquema de vacu:

- 1 dosis: a los 2 meses de vida
- 2 dosis: a los 3 meses de vida (21 a 30 días después de aplicada la 1ª dosis).
- De aquí en más se sigue aplicando de por vida 1 refuerzo anual a todos los animales (machos y hembras)

- Prevenir cambios bruscos en la alimentación de los animales.
- Mejorar la esquila para que haya menos heridas
- Cuando se apliquen productos inyectables, hacer una buena desinfección previa de jeringas y agujas.
- Si ha tenido casos de tétanos, al momento de la señalada mojar el piso del corral para que no se levante tierra y desinfectar el cuchillo entre animal y animal.
- Desinfectar las heridas con aerosol.
- Pensar en la castración con anillo de goma.

Bibliografía

https://www.produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infecciosas/ovinos/19-clostridiales.pdf