

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MATERIA: PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS
ESPECIES.

MEDICO: ETI JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ.

QUINTO CUATRIMESTRE.

ESTUDIANTE: MENDEZ ABARCA SAYURI YAMILETH.

ENFERMEDADES GENITOURINARIAS.

CISTITIS:

La cistitis consiste en una inflamación del tracto urinario inferior, compuesto por uretra y vejiga. Esto afecta al proceso fisiológico normal del perro, que podría sufrir dolor al orinar, expulsar orina con algo de sangre o, directamente, intentar orinar sin éxito.

La inflamación responsable de la cistitis puede ser causada por la presencia de bacterias que llegan a la vejiga a través del conducto de la uretra. Se dice entonces que la cistitis es una infección de orina.

La cistitis la pueden sufrir perros de cualquier edad. Las hembras lo sufren más porque tienen una uretra más corta que la de los machos. Además, una perra castrada será más propensa a sufrir de cistitis, ya que tiene más debilitado el esfínter de la vejiga, y esto propicia la entrada de bacterias.

SIGNOS CLINICOS:

Orina poco y muy a menudo, Orina con sangre, Bebe más agua de lo habitual y su comportamiento cambia.

FRENILLO PENEANO PERSISTENTE:

Es una banda de tejido conectivo que se extiende desde la punta del pene hasta el prepucio. Esta banda une al pene con el prepucio durante el desarrollo consecuencia de estrés mecánico normal.

SIGNOS CLINICOS:

Sangrado intermitente del pen, Lamido excesivo y Micción frecuente.

DEFORMIDAD CONGENITA DEL HUESO PENEANO.

Las deformidades del hueso peneano pueden producir desviación del pene y signos asociados como imposibilidad para retraer el pene dentro de la vaina prepucial o, predisponer a obstrucciones uretrales.

Cuando son leves, el único signo puede ser una aparente infertilidad por incapacidad para lograr la penetración vaginal. El tratamiento intentara corregir

la deformación y los signos asociados a ella. En el caso de que se trate de un reproductor, y la deformación sea leve puede utilizarse la inseminación artificial.

SIGNOS CLINICOS:

Imposibilidad para retraer el pene dentro de la vaina prepucial o, predisponer a obstrucciones uretrales.

FIMOSIS:

Incapacidad para protruir el pene a través del orificio del uretral, puede ser de origen congénito como en el caso de intersexo o adquirida a causa de anillos de pelos, inflamación, edema o neoplasias que produzcan un estrechamiento del orificio uretral.

SIGNOS CLINICOS:

Mucosas del pene, Automutilación, Edema y Necrosis.

TUMORES DEL PENE Y PREPUSIO.

El tumor venéreo transmisible canino es una neoplasia benigna de células redondas que afecta frecuentemente la mucosa genital externa de perros. El olfateo y el lamido permiten la implantación de las células tumorales en zonas extra genitales con forma de metástasis.

En los perros machos se pueden ver áreas nodulares rugosas similares, especialmente en lo profundo del surco del prepucial, que es un área que es difícil de visualizar, ciertamente en el macho consciente.

SIGNOS CLINICOS:

Loa perros contagiados de TVT pueden sufrir los siguientes síntomas: deformación nasal, dificultad respiratoria, ronquidos y secreciones sanguinolentas en la nariz o en la boca.

BALANOPOSTITIS:

Es la inflamación del glande del pene y de la mucosa prepucial. Puede estar causada por infección bacteriana o viral de agentes oportunistas que pueden o no ser parte de la flora normal, por dermatitis atópica o por automutilación.

SIGNOS CLINICOS:

Pus en el pene del perro, Olor fétido en el pene y Prepucio hinchado.

INCONTINENCIA URINARIA:

Significa que el perro es incapaz de evitar los escapes de orina. Generalmente no causa graves problemas en la salud de la perra, sin embargo, tiene un componente de higiene, que implica muchas veces la exclusión social de la mascota debido a situaciones indeseables que generan la pérdida de la orina en el ambiente en que vive.

SIGNOS CLINICOS:

Se hace pipi en su cama o su manta, Irritación e Infección.

VAGINITIS:

Es la inflamación de la vagina con secreción mucosa de aspecto purulento que se produce en cachorras antes de la madurez sexual. Es una patología autolimitante que desaparece con la aparición del primer celo.

Se presenta antes de la pubertad y que puede aparecer tan pronto como a los 2 o 3 meses de edad en forma de abundante secreción vaginal purulenta.

SIGNOS CLINICOS:

Aumento de la micción, Lamido excesivo de la zona, Frotar el área, Cambios en la vulva y la vagina y Cambios en el flujo vaginal.

BIBLIOGRAFIA

<https://www.expertoanimal.com/mi-perra-tiene-la-vulva-hinchada-causas-23233.html>

https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Cistitis-hemorragica-esteril-en-hembra-canina-tratada-por-11-meses-con_fig3_322851108

https://www.bulldogs.es/index.php?option=com_content&view=article&id=75:persistencia-del-frenillo-en-el-pene-del-bulldog-&catid=23:enfermedades-del-bulldog&Itemid=41

<https://www.diagnosticoveterinario.com/parafimosis-en-el-perro/1423>