

Nombre: Eduardo Avendaño Moreno

Asignatura: Patologías y técnicas quirúrgicas de pequeñas especies

Tema: Enfermedades parasitarias

Docente: Ety Arreola Jiménez

Cuatrimestre: 5to Cuatrimestre

Enfermedades parasitarias en perros y gatos

Toxocara canis

se

Localiza en el estómago y los intestinos del perro, donde puede alcanzar una longitud considerable de casi 20 cm.

Síntomas

Son

En los cachorros podríamos ver vómitos y diarrea intermitentes.

Strongiloides

Son

Un parásito que habita en la submucosa intestinal de los hospederos, desarrolla gran parte de su ciclo de vida en la tierra o el suelo.

Tx

Antiparasitarios:
Ivermectina y albendazol

Ancilostomidos

Son

Gusanos que miden entre 12 y 30 mm y poseen una gran cápsula bucal curvada y con dientes, lo que les confiere una mayor capacidad de dañar la mucosa intestinal de los perros.

Transmisión

Via

Oral
Percutánea
Mediante lactancia
Transplacentaria

Leishmania

se

Transmite a los perros por un grupo específico de vectores, los flebótomos) los cuales representan el principal riesgo de transmisión

Tenía canina

Esta

Habita en el intestino delgado de perros y gatos. La parasitación por tenías suele ser asintomático.

Proglotis

Son

Un saco de huevos móvil que la tenía elimina al exterior con las heces. Tiene el aspecto de un grano de arroz.

Spirocercia lupi

Tiene

La típica forma de gusano redondo y alcanzan de 4 a 8 cm de longitud. Los adultos son de color rojizo, a menudo enrollados en espiral.

Babesia

Esta

Afecta principalmente a los glóbulos rojos, y es causado por hematozoarios denominados Babesia canis y Babesia gibsoni.

Síntomas

Los primeros síntomas de la babesiosis son poco específicos, como fiebre, cansancio y pérdida

Dirofilaria immitis

Esta

Parasita principalmente el corazón y las arterias pulmonares a través del riego sanguíneo. Suelen acumularse en el ventrículo derecho y en los vasos sanguíneos de los pulmones, donde se desarrollan hasta alcanzar los 15 o 30 cm de longitud.

Síntomas

Son

Anorexia, ascitis, tos, hemorragias nasales, pérdida de peso, apatía, etc.

Toxoplasma gondi

su

Hospedador definitivo del parásito es el felino, pudiendo transmitir la enfermedad por eliminación de ooquistes al medio ambiente.

Dx

Análisis de sangre
Radiografía torácica
Ecografía

Trichuris vulpis

se

Ubica en el intestino grueso (ciego y colon), los adultos miden de 3 a 8 cm de longitud y son de color amarillento. Moxidectina, su tratamiento.