



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TAPACHULA



LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
5° CUATRIMESTRE

NOMBRE DEL ALUMNO:
KEREN CECILIA MÉNDEZ MORENO

PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS
ESPECIES

NOMBRE DEL DOCENTE:
ETI JOSEFINA ARREOLA RODRÍGUEZ

ENFERMEDADES VIRALES Y PREVENTIVAS EN PERROS

PARVOVÍRUS

La parvovirus se transmite principalmente a través del contacto directo con animales infectados, y también mediante objetos o superficies contaminadas, tiene un período de incubación corto (3 a 7 días)

Sus signos clínicos es fiebre, anorexia y depresión, pérdida de condición corporal, vómito y diarrea, deshidratación, no existe tratamiento para esta enfermedad

LEPTOSPIROSIS

Las bacterias que causan la leptospirosis se transmiten a través de la orina de los animales infectados y pueden sobrevivir en el agua o la tierra durante semanas o meses.

Signos clínicos: depresión, anorexia, rigidez, abortos, diarrea, disnea, fiebre, letargo, insuficiencia renal, anuria, vómitos. Utilizar antibióticos como tetraciclinas, penicilina/ampicilina

TOS DE LAS PERRERAS

Es una enfermedad de aparición aguda, localizada en las vías aéreas y producida por varios agentes infecciosos, suele desarrollarse de manera repentina una tos seca e intensa tras el contacto con un animal infectado.

Podemos prevenir con las vacunas, en tratamientos debemos administrar antibióticos combinados con el uso de broncodilatadores. Amoxicilina/clavulánico, enrofloxacin, trimetoprim-sulfa y tetraciclinas

RABIA

La rabia es una enfermedad infecciosa mortal de los mamíferos, incluidos los perros y las personas. El período de incubación (entre la infección y el brote de la enfermedad) es de entre dos y 24 semanas.

La primera fase suele durar varios días y se manifiesta principalmente con cambios en el comportamiento. La siguiente fase. El perro afectado está nervioso, violento y fácilmente irritable. En la fase paralítica, el perro sufre parálisis y espasmos, seguidos de un coma y la muerte.

HEPATITIS

El agente productor de la hepatitis infecciosa canina es un virus. Llega a afectar a perros de todas las edades, los síntomas varían ya que se puede llegar a confundir con otras enfermedades como moquillo o leptospira

Los animales afectados presentan: decaimiento, falta de apetito, fiebre, conjuntivitis, uveítis, temblores, convulsiones, parestias, vómitos, diarrea a veces sanguinolenta. La prevención de esta enfermedad se logra con la vacunación

MOQUILLO CANINO

Enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a perros de todas las edades. Es más frecuente en cachorros no vacunados a partir de las 6-12 semanas

Los síntomas son muy variables: malestar, pérdida de apetito, abatimiento, fiebre, tos, vómitos y diarrea hasta llegar a síntomas nerviosos como convulsiones. No existe tratamiento específico.