

Universidad del Sureste
Medicina Veterinaria y Zootecnia



MATERIA:

**PATOLOGIAS Y TECNICAS QUIRURGICAS DE AVES Y
CONEJOS**

MAESTRO:

ETY ARREOLA RODRIGUEZ

TRABAJO:

ENFERMEDADES DIGESTIVAS EN AVES

ALUMNA:

ALONDRA CABRERA CRUZ

Enfermedades Digestivas en AVES

Coccidiosis

producir enteritis y diarrea, retardo en el desarrollo, baja en la producción, pérdida de peso, pigmentación deficiente y mortalidad

Lesiones

localizadas en el intestino delgado, específicamente en el duodeno y parte inicial del yeyuno en casos de mayor gravedad.

Tratamiento

Toltrazuril 2.5% = 7mg/kg
Amprolio
Sulfaquinoxalina sódica

Síndrome de malabsorción aviar

postración, cojeras, diarreas, baja ganancia de peso vivo, emplume deficiente y retraso del crecimiento.

Tratamiento

Vacunación de gallinas reproductoras para el síndrome de malabsorción en aves con cepas de reovirus inactivadas

Enteritis Necrótica

enfermedad aguda que produce erosiones intestinales que involucran una destrucción severa de la mucosa intestinal lo cual aumenta marcadamente la mortalidad

lesiones

Las lesiones suelen aparecer en el intestino delgado (yeyuno e ileon)

Tratamiento

Bacitracina, penicilina o lincomicina, normalmente en el agua de bebida


CRITOSPORIDIOSIS AVIAR

es una infección por el protozoo *Cryptosporidium*.

El síntoma principal de la infección es diarrea acuosa, a menudo con otros signos de malestares gastrointestinales.

Tratamiento

No existe un tratamiento específico para la criptosporidiosis. Sin embargo, algunos pacientes pueden responder a ciertos antibióticos.




HISTOMINIASIS

enfermedad protozoárica causada por *Histomonas meleagridis*, y caracterizada por lesiones necróticas que afectan el hígado y el ciego.

Tratamiento

Benzimidazoles = antiparasitario interno para gusanos endoparásitos. Mezclado con alimento



Signos clínicos

Plumas erizadas
Alas cálidas
Apatía
Excrementos amarillos
Preferente en pavos

Portadores

portadores mecánicos de la enfermedad como moscas o roedores que simplemente pueden transportar los pegajosos huevos en sus cuerpos.

VOMITO NEGRO

caracteriza por lesiones en la molleja, en el proventrículo y buche, con una mayor incidencia en los pollos de engorde y cuya etiología responde a la alimentación con harina de pescado.

Síntomas

Anorexia
Depresión
Anorexia
Diarrea
Pallidez
Plumas erizadas
Distensión del buche

