



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ACTIVIDAD: ENSAYO

TEMA: DISTOCIA EN VACAS

DOCENTE: ETI JOSEFINA ARREOLA RODRÍGUEZ

MATERIA: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

ALUMNA: VIVIANA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ

CUATRIMESTRE: OCTAVO

PARCIAL: 2DO

LICENCIATURA: MEDICINA VET

INTRODUCCIÓN

Distocia se define como las complicaciones en el momento del parto y es presentada como un atraso en el parto, así como la completa incapacidad de parir por lo que requiere de intervención de un profesional veterinario, es uno de los problemas reproductivos más frecuentes en las vacas, ocasionando una serie de complicaciones tanto en el productor ganadero como a los mismos animales, entre las cuales se destacan: mortalidad perinatal, terneros débiles con bajo peso al destete, disminución de la eficiencia reproductiva, y incidencia de diversas enfermedades como son: retención de membranas fetales, metritis, endometritis así como prolapsos uterinos complicados lo que afecta directamente significativas pérdidas económicas en la industria ganadera.

Montilla Prado, Lady Catherine/Quintero Tapasco, Ana María (2020).

DISTOCIA

CAUSAS

Se les considera multifacetas ya que no se debe solo a la vaca si no también es ocasionada por el feto, los manejos que reciben las vacas, por lo que se clasifican en fetales y maternas.

MATERNAS

Dentro de estas causas incluyen:

LA INERCIA UTERINA: ocurre cuando el útero no se contrae de forma regular lo que provocara un estancamiento del parto y dificultades para que el ternero salga.

DILATACION INCOMPLETA DEL CERVIX: son causadas por la debilidad del tejido del cérvix también por inflamación e infección del cérvix por lo que ejercerá presión en el cérvix de forma desfavorable.

ANORMALIDADES EN LA PRESENTACION Y POSTURA DEL FETO: por razones obvias dificultan el paso a través del canal de paso, la mas frecuentes son las presentaciones posterior y transversal.

DESproporción Materno Fetal: ocurre cuando el feto es de gran tamaño las novillas de primer parto son mas tendientes a este problema.

FETALES

Por lo regular son debido a anomalías en la presentación, posición y postura del feto que tiene durante el trabajo del parto, en la presentación se refiere si el becerro viene hacia adelante o hacia atrás.

Se debe intervenir cuando se puede observar el saco en el transcurso de dos horas y la vaca no intenta pujar, si lo a intentado en un periodo de 30 minutos sin ninguna evolución.

Ya que se observa que probablemente sea signos de distocia, se deberá intervenir y determinar si fue a causa de la vaca o posición del feto, posterior a eso se determinara la forma en que solucionara y puede ser mediante fuerza aplicada o una cesárea, esto dependerá de la causa.

MANEJO Y PREVENCION DE LA DISTOCIA EN VACAS

Algunas de las pautas a considerar son:

EVALUACIÓN INICIAL.

Se basa en evaluar la condición en general de la vaca y determinar tamaño, así como la posición en la que se encuentra el ternero.

ASISTENCIA EXTERNA.

Esto es en casos de distocias leves, esta asistencia puede ser suficiente para resolver el problema, utilizando lubricantes, técnicas adecuadas para facilitar el desprendimiento de ternero.

DISTOCIAS SEVERAS.

Se necesitará de una cesárea de emergencia.

MONITORIZACION POST OPERATORIA.

Después de una cesárea o procedimiento que se utilizo es muy importante monitorear su estado de salud y brindar la analgesia, así como los medicamentos adecuados, se recomienda utilizar antiinflamatorios como xilacia, así como anestesia local

BIBLIOGRAFIA

<https://repositorio.utp.edu.co/items/c216ba94-5e51-4214-8b25-539820a9deb8>

<https://www.universodelasaludanimal.com/ganaderia/distocia-en-bovinos-problemas-de-parto-en-vacas/>