



UDS

Mi Universidad

Cuadro comparativo

Nombre del Alumno: Lourdes alvarez Hernández

Nombre del tema: demencias

Parcial: I

Nombre de la Materia: Fisiopatología

Nombre del profesor: Jaime Heleria Ceron

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5°

CARACTERÍSTICAS

ALZHEIMER

EPILEPSIA

CUERPOS DE LEWY

Etiología

Causa más común de demencia.
Mayor prevalencia en >65 años.

Trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro, lo que provoca convulsión

Tercer causa de demencia
Comienza entre los 50-70 años.

Clinica

Alteraciones del lenguaje
Falta de memoria corto y largo plazo.
Desorientación en tiempo y lugar.
Prosopagnosia

Se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario que pueden involucrar una parte del cuerpo (parcial) o todo el cuerpo (generalizado) y en ocasiones se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función intestinal o vesical.^{7s}

Demencia progresiva con dos de los siguientes:
Alucinaciones visuales
Cognición fluctuante

Diagnóstico

Criterios clínicos de Alzheimer
Histopatológico
Presencia de proteínas precursoras de beta amiloides

cuando ha tenido dos o más convulsiones. Una convulsión es un cambio breve en la actividad normal del cerebro. Las convulsiones son el principal signo de la epilepsia. Algunas convulsiones pueden parecer episodios catatónicos.

Imagen
Pety spect
Patológico
cuerpos de lewy:ovillo

Tratamiento

La galantamina, la rivastigmina y el donepezilo son inhibidores de la colinesterasa que se recetan para los síntomas de leves a moderados de la enfermedad de Alzheimer. Estos medicamentos pueden

La monoterapia (tratamiento con un solo medicamento) es la mejor opción para tratar a las personas con epilepsia de diagnóstico reciente..

Los medicamentos pueden ayudar con algunos de los síntomas cognitivos, de movimiento y psiquiátricos.¹⁹ di Donepezilo