



NOMBRE DEL ALUMNO: JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ GUZMÁN.

**NOMBRE DEL TEMA: CUADRO COMPARATIVO DE LAS
PATOLOGÍAS.**

**NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGÍA DEL NIÑO Y EL
ADOLESCENTE .**

NOMBRE DE LA MAESTRA: CECILIA DE LA CRUZ SANCHEZ.

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERÍA.

CUATRIMESTRE: QUINTO CUATRIMESTRE .

CUADRO COMPARATIVO

	ETIOLOGÍA	CUADRO CLÍNICO	MEDIOS DE DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO Y MEDIDAS PREVENTIVAS
TOSFERINA	Infección del tracto respiratorio muy contagiosa que se puede prevenir fácilmente con una vacuna.	Además de la tos con un sonido característico, los síntomas incluyen secreción nasal, congestión nasal y estornudos.	Una prueba de cultivo nasofaríngeo.	La mejor manera de prevenir la tosferina es vacunándose. Los CDC recomiendan las vacunas contra la tosferina para todas las personas.
DIFTERIA	Infección aguda de la nariz y la garganta.	Los síntomas son dolor de garganta, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos y debilidad.	Pueden tomar una muestra de la parte de atrás de la garganta o la nariz con un bastoncito de algodón (hisopo) y analizarla para detectar la bacteria que causa la difteria.	hay cuatro vacunas combinadas que se usan para prevenir la difteria: DTaP, Tdap, DT , y Td.
TETANOS	El tétanos es una enfermedad zoonótica aguda, producida por las exotoxinas de Clostridium tetani perteneciente a la Familia Clostridiaceae.	Músculo abdominal rígidos, espasmos dolorosos y rigidez en los músculos del cuello, dificultad para tragar, tensión de los músculos alrededor del los labios...	basándose en un examen físico, los antecedentes médicos y de vacunación, y los signos y síntomas de espasmos musculares, rigidez muscular y dolor.	El tétanos es prevenible mediante la inmunización con vacunas que contienen toxoide tetánico (VCTT).
POLIOMELITIS	Virus que puede provocar parálisis.	Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolor en las extremidades.	Para confirmar el diagnóstico, puede identificarse el virus de la poliomielitis con un análisis de laboratorio de una muestra de heces.	El tratamiento es sintomático para los casos leves, mediante analgésicos para tratar el dolor y la fiebre. En casos graves se puede requerir incluso respiración asistida, si hay parálisis de los músculos respiratorios.
VARICELA	La varicela es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de la varicela-zóster (VVZ).	El síntoma clásico de la varicela es un sarpullido que se convierte en ampollas llenas de líquido que pican, que al final se vuelven costras.	Puede confirmar con pruebas de laboratorio, lo que incluye un análisis de sangre o un estudio de los tejidos de la piel afectada.	Aplicarse loción con calamina o darse un baño fresco con bicarbonato de sodio, avena sin cocinar o avena coloidal podría dar algo de alivio para la picazón. Trate de mantener las uñas cortas y rascarse lo menos posible para prevenir propagar el virus a los demás y las infecciones en la piel.

Bibliografías:

<https://www.cdc.gov/chickenpox/about/prevention-treatment-sp.html#:~:text=Aplicarse%20loci%C3%B3n%20con%20calamina%20o,las%20infecciones%20en%20la%20piel.>

<https://www.cdc.gov/polio/es/que-es-polio/index.htm>

<https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/tetanus#:~:text=El%20t%C3%A9tanos%20es%20prevenible%20mediante,y%20pueden%20volver%20a%20infectarse.>

<https://www.cdc.gov/diphtheria/about/diagnosis-treatment-sp.html#:~:text=Los%20m%C3%A9dicos%20por%20lo%20general,bacteria%20que%20causa%20la%20difteria.>

<https://www.cdc.gov/pertussis/about/signs-symptoms-sp.html>