



**Mi Universidad**

**CUADRO COMPRATIVO**

*Nombre del Alumno: Yesica Ledezma Vázquez*

*Nombre del tema: Aborto espontaneo*

*Aborto incompleto*

*Aborto completo*

*Aborto inevitable*

*Huevo muerto retenido*

*Parcial: I*

*Nombre de la Materia: Ginecologia y obstetricia*

*Nombre del profesor: Jaime Heleria Ceron*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 5to*

# CUADRO COMPARATIVO

Aborto Espontaneo	Aborto Incompleto	Aborto Completo	Aborto Inevitable	Huevo muerto retenido
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ También conocido como pérdida del embarazo, es cuando pierdes un embarazo antes de la semana 20 de embarazo.</li> <li>○ Es causado cuando el óvulo fertilizado tiene un número de cromosomas (genes) que no es normal.</li> <li>○ <b>Cuadro clínico:</b> Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sangrado vaginal con o sin dolor</li> <li>○ Calambres en la zona pélvica o en la parte baja de la espalda</li> <li>○ Líquido o tejido que sale de la vagina</li> <li>○ Latidos rápidos del corazón.</li> </ul> </li> <li>○ <b>Diagnóstico:</b> Es posible que el equipo de atención médica te haga varias pruebas. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Análisis de sangre.</li> <li>○ Examen pélvico.</li> <li>○ Ecografía.</li> <li>○ Pruebas de tejidos</li> <li>○ Pruebas cromosómicas</li> </ul> </li> <li>○ <b>Tratamientos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amenaza de aborto espontáneo: Si tienes sangrado vaginal al principio del embarazo, el equipo de atención médica puede recomendarte que guardes reposo hasta que mejoren los síntomas.</li> <li>Aborto espontáneo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conducta expectante.</li> <li>○ Tratamiento médico.</li> <li>○ Aspiración uterina</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultado de cuando un embarazo ya no sigue su curso, y sin embargo, aún existe tejido residual dentro del útero</li> <li>• La causa "universal," los abortos incompletos suelen ocurrir cuando el producto ya es demasiado grande para ser expulsado sólo por los espasmos que provocan las pastillas.</li> <li>• <b>Cuadro clínico:</b> Los signos de un aborto incompleto son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemorragia excesiva y/o prolongada</li> <li>• Dolor abdominal intenso o calambres</li> <li>• Sensibilidad abdominal cuando se aplica presión</li> <li>• Dolor prolongado (que dura más de unos días)</li> <li>• Fiebre alta o prolongada</li> </ul> </li> <li>○ <b>Diagnósticos:</b> Hay que tener en cuenta que el aborto incompleto también puede darse tras un aborto espontáneo (involuntario.) Sea cual sea el caso, hay que prestar atención a síntomas que indican la posible presencia de tejido en el útero.</li> <li>• El tratamiento dependerá de tu estado de salud, el cómo te sientas y los síntomas que presentes. La primera acción que los médicos toman es dejar pasar unos días para darle la oportunidad a tu útero de que se limpie por sí solo y no someterte a procedimientos innecesarios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Expulsión completa del saco ovular (placenta y embrión).</li> <li>▪ <i>Son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé.</i></li> <li>▪ <b>Cuadro clínico:</b> Los posibles síntomas de un aborto espontáneo pueden incluir: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lumbago o dolor abdominal sordo, agudo o de tipo cólico</li> <li>▪ Material tisular o en forma de coágulos que sale de la vagina</li> <li>▪ Sangrado vaginal con o sin cólicos abdominales</li> </ul> </li> <li><b>Diagnósticos:</b> Durante un examen pélvico, su proveedor puede observar que su cuello uterino se ha abierto (dilatado).</li> <li>Se puede hacer un ultrasonido abdominal o vaginal para verificar el desarrollo del bebé, los latidos cardíacos y la cantidad de su sangrado.</li> <li>▪ <b>Tratamientos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obtén atención prenatal periódica mientras estés en embarazo y justo después de dar a luz.</li> <li>▪ Toma diariamente un multivitamínico.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ No se pueden detener los síntomas y se presenta el aborto espontáneo.</li> <li>□ Es causado porque el feto no se desarrolla adecuadamente.</li> <li>□ <b>Cuadro clínico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dolor intenso en el abdomen.</li> <li>✓ Cólicos muy fuertes.</li> <li>✓ Dolor, presión o molestia en la espalda baja.</li> <li>✓ Cambios en tu flujo vaginal</li> </ul> </li> <li>□ <b>Diagnósticos:</b> la única manera de descubrir esta situación es en una revisión rutinaria en la que se lleve a cabo una ecografía. Será esta prueba la que revele que el corazón del feto ya no late (y que incluso nunca llegó a latir).</li> <li>□ <b>Tratamientos:</b> No existe un tipo de tratamiento como tal solo ciertas indicaciones que es el reposo en cama y sedantes uterinos. También en algunos casos se da progesterona, aunque algunos estudios científicos no acaban de ponerse de acuerdo sobre su eficiencia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cuando no se elimina de forma espontánea el huevo y los restos ovulares del aborto ya ocurrido</li> <li>✓ Puede ocurrir debido a alteraciones cromosómicas, malformaciones fetales, problemas en el útero, como cicatrices uterinas, o por problemas endocrinos, como alteraciones en la tiroides no tratadas o diabetes descontrolada.</li> <li>✓ <b>Cuadro clínico:</b> Los síntomas de un aborto retenido pueden variar: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Insuficiencia cardíaca fetal.</li> <li>✓ Cierre cervical.</li> <li>✓ Falta de agrandamiento del útero.</li> <li>✓ Disminución de los síntomas del embarazo.</li> <li>✓ Disminución en el nivel de la hormona hCG.</li> </ul> </li> <li>✓ <b>Diagnósticos:</b> Los signos ecográficos que permiten de forma inequívoca establecer el diagnóstico de aborto diferido son la ausencia de actividad cardíaca en un embrión con longitud céfalo-caudal (LCC) &gt;5 mm o la ausencia de actividad cardíaca en un embrión con LCC &gt;3,5 mm o la presencia de un saco gestacional.</li> <li>✓ Las opciones de tratamiento incluyen: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manejo expectante</li> <li>✓ Dilatación y legrado</li> <li>✓ Medicamentos</li> <li>✓ Aspirado al vacío</li> </ul> </li> </ul>

