



**Nombre del alumno: Angel Antonio
Guzmán Cornelio**

Tema: Tipos de abortos

Materia: Ginecología y obstetricia

**Nombre del profesor: Jaime Heleria
Ceron**

Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5to

TIPOS DE ABORTOS

	CONCEPTO	ETIOLOGIA	CUADRO CLINICO	DIAGNOSTICO
ABORTO ESPONTANEO	Un aborto espontáneo, también conocido como pérdida del embarazo, es cuando pierdes un embarazo antes de la semana 20 de embarazo	La mayoría de los abortos espontáneos son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé. En pocas ocasiones.	Lumbago o dolor abdominal sordo, agudo o de tipo cólico. Material tisular o en forma de coágulos que sale de la vagina. Sangrado vaginal con o sin cólicos abdominales.	examen pelviano, mediante la medición de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana. En general, el tratamiento es la conducta expectante para la amenaza de aborto
ABORTO INCOMPLETO	Un aborto incompleto sucede cuando el embarazo no es expulsado. Será necesario que se practique un aborto en la clínica para completar el aborto. Sangrado abundante. Infección.	El aborto incompleto se puede derivar de un aborto espontáneo o inducido y se presenta cuando ocurre la expulsión parcial del producto de la concepción	Los signos de un aborto incompleto son los siguientes: Hemorragia excesiva y/o prolongada. Dolor abdominal intenso o calambres. Sensibilidad abdominal cuando se aplica presión.	se suele utilizar un grosor de la línea media uterina ≥ 15 mm, medida con sonda vaginal(6). Además, la presencia de una ecogenicidad heterogénea hace sospechar la existencia de restos ovulares en el útero
ABORTO INEVITABLE	se pueden detener los síntomas y se presenta el aborto espontáneo. Aborto infectado (séptico): el revestimiento del vientre (útero) y cualquier producto restante de la concepción resultan infectados	La mayoría de los abortos espontáneos son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé. En pocas ocasiones, estos problemas tienen relación con los genes del padre o de la madre.	Los posibles síntomas de un aborto espontáneo pueden incluir: Lumbago o dolor abdominal sordo, agudo o de tipo cólico. Material tisular o en forma de coágulos que sale de la vagina. Sangrado vaginal con o sin cólicos abdominales.	Los signos y síntomas más frecuentes en los casos de aborto inevitable fueron: sangrado transvaginal (40%), pérdida de líquido amniótico (22,9%) y dolor pélvico (18,6%). El 32% de las pacientes se presentó con los orificios cervicales abiertos y el 94% con disminución del líquido amniótico.

TIPOS DE ABORTOS

	CONCEPTO	ETIOLOGIA	CUADRO CLINICO	DIAGNOSTICO
ABORTO COMPLETO	es cuando cuello uterino cerrado después de la expulsión fuera del útero del feto y de la placenta. Aborto incompleto: dilatación del cuello uterino y expulsión solo de una parte del contenido del útero.	la mayoría de los abortos espontáneos son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé	sangrado vaginal con dolor o sin dolor, como un sangrado leve que se conoce como manchado. dolor o calambres en la zona pélvica liquido que sale de la vagina.	presencia de vitalidad del embrion-feto prueba de embarazo positiva USG: presencia de fcf, movimientos fetales, visualizacion del saco vitelino
HUEVO MUERTO RETENIDO	El aborto espontáneo puede denominarse Huevo muerto retenido o Aborto diferido, cuando no se elimina de forma espontánea el huevo y los restos ovulares del aborto ya ocurrido	e debe a problemas genéticos, denominados aneuploidias, es decir, alteración en el número normal de cromosomas. También existen otros factores que influyen como trastornos hormonales o infecciones.	<ul style="list-style-type: none">• insuficiencia cardiaca fetal• Cierre cervical• falta de agrandamiento del útero• Disminución de los síntomas del embarazo	se presenta cuando habiendo ocurrido la muerte del producto de la concepción, no se expulsa en forma espontánea. Esta entidad presupone un lapso entre la muerte ovular