



## Mi Universidad

Nombre del Alumno: perla Guadalupe López  
mondragon

Nombre del tema: Tipos de maduración  
durante el crecimiento y desarrollo del niño y  
del adolescente

Parcial: 1

Nombre de la Materia: ENFERMERIA DEL  
NIÑO Y ADOLESCENTE

Nombre del profesor: SANDRA YAZMIN RUIZ  
FLORES

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5

TIPOS DE  
MADURACION  
DURANTE EL  
CRECIMIENTO Y  
DESARROLLO DEL  
NIÑO

maduración somática,

velocidad de crecimiento durante el tiempo y por medio del PVC diagnosticado a través de medidas antropométricas.

requiere de dos mediciones con intervalos no menores de tres meses y no mayores de 18 meses. La velocidad de crecimiento se considera normal cuando se ubica al niño y/o adolescente

psicológica

la etapa prenatal, la niñez, la primera infancia, la infancia intermedia y la adolescencia

Cuando hablamos de desarrollo psicológico en la infancia hacemos referencia a las etapas de este proceso por el que pasan los menores hasta superar la adolescencia. En este caso nos referimos a los siguientes periodos: la etapa prenatal, la niñez, la primera infancia, la infancia intermedia y la adolescencia.

social

no consiste simplemente en la facultad de vivir, trabajar y divertirse en compañía de otras personas, sino también abarca la de disfrutar al máximo esas actividades.

El aprendizaje es el factor más importante en el desarrollo de la conducta social, siendo durante los primeros años escolares cuando se localizan grandes progresos entre los que cabe destacar

Tipos de maduración durante el crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente

### Crecimiento físico en adolescentes

Se da un estirón de crecimiento importante durante la adolescencia. El estirón de crecimiento en los niños se da durante la mitad de la adolescencia, entre las edades de 12 y 16 años (habitualmente alrededor de los 13 años y medio) y por lo general comienza un año después de que los testículos empiecen a aumentar de tamaño

Los niños varones pueden llegar a crecer unos 10 cm durante el año de crecimiento máximo. Las niñas pueden llegar a crecer unos 9 cm durante el año de crecimiento máximo.

### Maduración sexual en adolescentes

La maduración sexual (pubertad) comienza a diferentes edades dependiendo de factores genéticos y ambientales. Hoy en día comienza antes que hace un siglo, probablemente debido a las mejoras en la nutrición, la salud general y las condiciones de vida.

En los varones, los cambios sexuales empiezan con el aumento de tamaño del escroto y los testículos, seguido, en general, del agrandamiento del pene (véase Pubertad en los chicos). A continuación, aparece vello púbico. En las niñas, el crecimiento incipiente de las mamas es el primer signo de maduración sexual, seguido de cerca por el inicio del estirón de crecimiento (véase Pubertad en las niñas). Poco después, aparece vello púbico y axilar.