


VIAS DE ADMINISTRACIÓN

ORAL



WORM-EX

(Ivermectina, Albendazol y Praciquantel)

Aves adultas: una tableta en dosis única. Es conveniente repetir la dosis cada 30 días.

COCCIZURIL


(Toltrazuril)

Aves de 100 a 750 g de PC 1/4 de tableta directa al pico.

Aves de 750 g. a 1 kg de PC 1/2 tableta directa al pico

Aves de 1.5 a 3 kg de PC una tableta directa al pico

RECTAL



ATP SHOCK

(Glucosa)


1 supositorio dos o tres horas antes de la prueba según lo indique el veterinario.

PET-EMA

(Sulfosuxinato de Sodio diotilo)

1 jeringa de ml por ejemplar

TÓPICA



HEXIDERM

(Hexetidina, Benzocaína y Prednisolona)

Aplicar dos veces al día en las áreas afectadas sobre la piel. Antes de su aplicación puede ser necesario cortar el pelo.


PEDEROL

(Clortetraciclina clorhidrato)

Previa limpieza de la zona a tratar y eliminación de tejidos necrosados pulverizar la zona afectada hasta cubrir ésta.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN

OFTÁLMICA



LODYVET

(Ibuprofeno Sódico)


Una gota en el ojo afectado de 2 a 4 veces al día

GENTADEx

(Gentamicina, Dexametasona)

Aplicar una o dos gotas en cada ojo de 2 a 4 veces al día, durante 4 días a criterio del médico veterinario

ÓTICA



POSATEX

(Orbifloxacina, Posaconazol)


Perros menores a 2 kg, 2 gotas al oído una vez al día
Perros de 2 a 15 kg, 4 gotas al oído una vez al día
Perros mayores a 15 kg, aplicar 8 gotas al oído una vez al día

AURICIL

(Bacitracina)

De 3 a 5 gotas en el oído afectado y de un masaje suave. Aplique 2 veces al día

SUBCUTÁNEA



FLUVET

(Flumetazona)

Caninos: de 0.06 a 0.25 mg/kg (0.12 a 0.5 ml/kg)
Felinos: de 0.03 a 0.125 mg/kg (0.06 a 0.25 ml/kg)
Equinos: de 1.25 a 2.5 mg/kg (2.5 a 5 ml/kg)


IVERMECTINA 1%

(Ivermectina)

Bovinos: 1 ml/50 kg de peso.
Porcinos: 1 ml/33 kg de peso

VIAS DE ADMINISTRACIÓN

INTRAMUSCULAR



MULTIBIO

(Ampicilina base, Sulfato de Colistina, Acetato de Dexametasona)


1 ml/10 kg. Durante 3 días

METOCLOP

(Metoclopramida)

1 ml/ 10 kg de peso cada 8 horas.

INTRAVENOSA



GORBAN

(Sulfadoxina, Trimetropim)

Administrar una dosis de 3ml/50 kg de peso en todas las especies indicadas.


SALIX

(Furosemida, Monoetanolamina)

Equinos y Bovinos: 1-2 ml/100 kg (0.5 a 1.0 mg/kg) una o dos veces al día

Perros y gatos: 0.1-0.2 ml/5 kg (1-2 mg/kg)

INTRAPERITONEAL



DEXHIDRO-VIT

(Dextrosa, Acetato de sodio, Cloruro de calcio y potasio, Sulfato de magnesio, Vitamina B1, tiamina, Vitamina B2, Riboflavina, Nicotinamida,)

Administrar de 1 a 5 ml/kg

AMINOFORTE F

(Dextrosa, Cloruro de magnesio, Cloruro de Potasio, Sulfato de magnesio, Acetato de sodio, Nicotinamida)

1 ml/5 kg entre 1 y 3 veces al día.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN

EPIDURAL

MIDAZOLAM

(Midazolam)

1 mg/kg

LIDOR 2%

(Lidocaína)

4 a 5 ml (80 a 100 mg lidocaína)

INTRAMAMARIA

MASTIJET FORT

(Hidrocloruro de tetraciclina, Neomicina, Bacitracina, Prednisolona)

Administrar una jeringa por infusión en cada cuarteto afectado

CLAVAMOX LC

(Amoxicilina trihidrato, ácido Clavulánico, Prednisolona)

Introducir el contenido de una jeringa masajeando luego una adecuada dispersión. Repetir cada 12 horas hasta totalizar tres aplicaciones

SUBDÉRMICA

COMPUDOSE 200

(Estradiol, Oxitetraciclina)

Se aplica un implante de 25 mg, con una duración de 200, según programada de engorde

IMPLEMAX

(Acetato de treembolona, 17 b Estradiol)

Administrar un implante (8 comprimidos) en el tercio de la cara posterior de la oreja del animal)