

“Sarna”

Medicina veterinaria y zootecnia

5to cuatrimestre

**PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE AVES Y
CONEJOS**

Docente: Adrián Balbuena Espinosa

Alumno: Yuliana Aremy Morales López

5 de Abril del 2024

SARNA EN CONEJOS

La sarna es una afección cutánea muy contagiosa causada por ácaros parásitos que se alimentan de la piel. Estos ácaros microscópicos excavan túneles en la capa superior de la piel, donde ponen sus huevos.



Los animales que son catalogados como presa, como lo es el conejo, a menudo tratan de ocultar sus enfermedades. Esto lo hacen para no mostrar debilidad a los cazadores. Sin embargo, a veces esto puede llevar a que los síntomas no sean detectados hasta que el padecimiento está muy avanzado.

TIPOS DE SARNA

cuando se trata de sarna los síntomas específicos dependerán del tipo de sarna que haya contraído el animal, los cuales vienen determinados por los distintos parásitos que desencadenan la enfermedad:

1. Sarna sarcóptica

Es producida por el ácaro *Sarcoptes scabiei*. Los signos clínicos son:

- Costras blancas en ojos, oídos, dedos, boca y orejas
- Olor fétido en las zonas afectadas
- Comezón, lo que hace que el conejo se rasque
- Caída del pelo
- La piel se cuartea, lo cual puede provocar sangrado

2. Sarna psoróptica o auricular

Afecta el pabellón de las orejas, donde se concentran las costras. Es posible apreciar el ácaro en la piel del animal, llamado *Psoroptes*. Presenta:

- Inquietud
- Comezón
- Costras
- Se acumula cera en las orejas
- Mal olor
- Puede derivar en otitis
- Puede extenderse a la parte externa de la oreja, provocando la caída del pelo y más comezón.

3. Sarna notoédrica

Es producida por el *Notoedres californicus* y afecta la cabeza. Se aprecian los mismos síntomas que con la sarna sarcóptica:

- Costras
- Mal olor
- Caída del pelo
- Comezón



4. Sarna dermodéctica

La genera el Demodex cuniculi, atacando las capas más profundas de la piel, lo cual trae como consecuencia:

- Engrosamiento de la dermis
- Lesiones en orejas, cuello y cara
- Caída del pelo

5. Sarna coriódica

El culpables es el ácaro Chorioptes cuniculi, el cual también afecta las orejas pero con una intensidad más leve.

La comezón que generan estos distintos tipos de sarna hace que el conejo se rasque constantemente las zonas en las que tiene las costras, lo cual propicia la aparición de otras infecciones. Las llagas pueden abrirse y empeorar, supurando pus y sangre, lo cual, unido al malestar general del conejo, puede provocar anemia y posteriormente la muerte.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Realizar un raspado de piel para determinar el tipo de acaro con la observación a través del microscopio.

Tratamiento: ivermectina oral o ivermectina inyectable. Si se opta por la ivermectina, se necesita un mínimo de tres dosis de ivermectina cada dos semanas. La sarna se trata con 3 inyecciones de ivermectina, una cada 14 días., proporcionar al conejo buena alimentación, espacios ventilados y limpios, desinfectar los espacios que habita el conejo.

Las heridas pueden ser tratadas con benzoato de bencilo cada cinco días.

BIBLIOGRAFIA:

[HTTPS://WWW.EXPERTOANIMAL.COM/SARNA-EN-CONEJOS-SINTOMAS-Y-TRATAMIENTO-22203.HTML](https://www.expertoanimal.com/sarna-en-conejos-sintomas-y-tratamiento-22203.html)

[HTTPS://MASCOTAFIEL.COM/SARNA-EN-CONEJOS/](https://mascotafiel.com/sarna-en-conejos/)

