



**Universidad del
sureste**

“VACUNAS”

**Medicina veterinaria y zootecnia
5to cuatrimestre**

**PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE AVES Y
CONEJOS**

Docente: Adrián Balbuena Espinosa

Alumno: Yuliana Aremy Morales López

de Febrero del 2024

VACUNAS



BOVINOS

BECERROS 2-3 MESES DE NACIDOS

Bovilis vista once SQ, rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), virus de la diarrea viral bovina (BVD) (tipos 1 y 2), virus de parainfluenza3 (PI3), virus respiratorio sincitial bovino (BRSV) y cultivos vivos avirulentos de Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida.

2 MESES ANTES DE LA MONTA PARA PROTEGER A LA VACA Y AL BECERRO DE ENFERMEDADES ABORTIVAS, CLOSTRIDIASIS

Bovilis vista 5 L5: virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), virus de la diarrea viral bovina (BVD) (Tipos 1 y 2), virus de parainfluenza 3 (PI3), virus respiratorio sincitial bovino (BRSV) y cultivos de L. canicola, L. gryppotyphosa, L. hardjo, L. icterohaemorrhagiae y L. Pomona con un adyuvante patentado.

BECERROS 6-8 MESES CLOSTRIDIUM

bovilis vision 8 HS, Como ayuda en la prevención de enfermedades causadas por C. chauvoei (Pierna negra), C. septicum (edema maligno), C. haemolyticum (hemoglobinuria bacilar), C. novyi (enfermedad negra), C. sordellii y C. perfringens tipos C y D (Enterotoxemia).

refuerzo a las 3 o 4 semanas posteriores a la primera aplicación. Revacunación anual.

brucella abortus bang RB cada 6 meses

1 mes despues rabia

VACUNAS



AVES

10 DIAS DE VIDA

New castle



3 SEMANAS DE VIDA

viruela aviar refuerzo despues de 10 a 20 dias. cada año en aves adultas



TRIPLE AVIAR + CORIZA

viruela aviar refuerzo despues de 10 a 20 dias, cada 5 a 6 meses en aves adultas



VACUNAS



PORCINOS

**CERDAS GESTANTES
5 A 4 MESES ANTES
DEL PARTO**

**Rinitis atrofica
"porcilis AR-T DF"**
repetir entre la 3 o 2da
semana antes del parto



3 SEMANAS DE VIDA

PORCILIS® PCV M HYO
Vacuna contra la infección causada por el Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2) y M. hyopneumoniae en cerdos, y Mycoplasma hyopneumoniae



**5 MESES DE VIDA,
HEMBRAS- 2 DIAS
ANTES DE CADA
MONTA
MACHOS CADA 6
MESES**

PORCILIS® Ery+Parvo+Lepto
previene los problemas reproductivos causados por parvovirus porcino (PPV) y los siguientes serogrupos de Leptospira : L. interrogans serogrupo Canicola, L. interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae, L. interrogans serogrupo Australis (Bratislava), L. kirschneri serogrupo Grippotyphosa, L. interrogans serogrupo Pomona, L. santarosai serogrupo Tarassovi.

