

CALENDARIO DE VACUNACION EN BOVINOS

CARBON SINTOMATICO { BACTERINA { EDAD A LA QUE SE DEBE APLICAR A LOS 3-4 MESES DE NACIDOS { REFUERZO A LOS 6 MESES DE LA PRIMERA VACUNACION

SEPTICEMIA HEMORRAGICA { BACTERINA { EDADA A LA QUE SEBE APLICAR A LOS 4MESES DE NACIDOS { REFUERZO A LOS 6 MESES DE LA PRIMERA VACUNACION

DERRIENGUE { VIRUS { SE APLICA A LOS 2 O 3 MESES DE VIDA { EL REFUERZO ES AL AÑO DE VIDA

CALENDARIO DE VACUNACION EN AVES

VIRUS DE LA VIRUELA AVIAR

{ VIRUS

{ LA VACUNA SE APLICA DESDE LA PRIMER SEMANA EN LA SEMANA QUE NACEN

{ EL REFUERZO SE APLICA DE LA 3RA A LA 6TA SEMANA DE NACIDOS

TRIPLE AVIAR

{ VIRUS

{ LA VACUNA SE APLICA EN LOS PRIMEROS 10 DIAS DE NACIDOS

{ EL REFUERZO SE APLICA A LOS 21 DIAS DE NACIDOS

NEWCASTLE

{ VIRUS

{ LA PRIMERA VACUNA SE APLICA EN LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE NACIDO

{ EL REFUERZO SE APLICA WN LA 3RA Y 6TA SEMANA DE NACIDO

CALENDARIO DE VACUNACION EN PORCINOS

INFLUENZA PORCINA

{ VIRUS

{ LA PRIMERA APLICACIÓN ES EN LA 4TA SEMANA DE VIDA

{ EL REFUERZO SE APLICA A LA 2DA O 3RA SEMANA DESPUES DE LA PRIMERA APLICACIÓN

VACUNA TRIPLE

{ VIRUS

{ LA PRIMERA APLICACIÓN ES A LOS 80 DIAS DE NACIDO

{ EL REFUERZO SE APLICA A LOS 20 DIAS DESPUES DE LA PRIMERA APLICACIÓN

NEUMONIA ENZOOTICA

{ VIRUS

{ LA PRIMERA APLICACIÓN ES A LOS 15 DIAS DE NACIDO

{ LA SEGUNDA APLICACIÓN ES A LOS 30 DIAS DESPUES DE LA PRIMERA APLICACIÓN