



**Mi Universidad**

**Nombre del alumno: ITATI**

**CAROLINA ESCOBAR ROBLERO**

**NOMBRE DEL PROFESOR :**

**RUBEN EDUARDO DOMÍNGUEZ**

**GARCIA**

**MATERIA :**

**ENFERMERÍA MEDICO QUIRURJICA**

**CUATRIMESTRE :**

**GRUPO : A**



# ENFERMO EN AISLAMIENTO

## AISLAMIENTO RESPIRATORIO

aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). Ejemplo: Meningitis meningocócica o por H. Influenza, Varicela, Meningitis meningocócica, Rubéola, Sarampión, Tosferina, Tuberculosis Pulmonar.

**Características (Además de la precaución estándar):**

- ⊞ Características (Además de la precaución estándar):
- ⊞ Habitación Individual: en lo posible, si no es posible establecer separación espacial de al menos 1 metro con otro paciente.
- ⊞ Lavado de Manos- Mascarilla: Obligatorio para cualquier persona que se acerque a menos de un metro del paciente.
- ⊞ Guantes
- ⊞ Gafas o lentes: en procedimientos de aspiración, KTR, laringoscop

aplican a enfermedades transmitidas por vía aérea por medio de gotas de secreciones que miden menos de 5 micras, por lo cual son eliminadas por el paciente al hablar o toser, quedan suspendidas en el aire y viajan más allá del metro ocupando toda la habitación.

Los agentes que se diseminan de esta manera son: Mycobacterium tuberculosis, sarampión, varicela, herpes zoster diseminado y hantavirus

**Medidas:** - Lavado de manos - Habitación individual con puerta cerrada y condiciones ambientales de ventilación

## AISLAMIENTO DE CONTACTO

utiliza cuando existe la sospecha de una enfermedad transmisible por contacto directo con el paciente o con elementos de su ambiente. Es aplicable a las enfermedades infecciosas que se propagan por contacto directo, las cuales se dividen en dos categorías:

- ⊞ Contacto con heridas y lesiones cutáneas.
- ⊞ Contacto con secreciones orales.

Por ejemplo: Diarrea por Clostridium difficile; Celulitis con exudado; úlceras mayores con apósitos incontinentes; Sarna; Gangrena gaseosa, Heridas abiertas, Piодemias estafilocócicas, Quemaduras de menos del 25 %.

Ejemplos: pacientes infectados o colonizados por SMRA, ABRIM. Enfermedades entéricas por Clostridium Difficile, y en pacientes incontinentes por E. Coli, Shigella, Hepatitis A y Rotavirus. Virus sincitial respiratorio en niños. Infecciones cutáneas como impétigo, Pediculosis, Escabiosis, Herpes Zoster diseminado o en inmunodeprimid

**Características (Además de la precaución estándar):**

- ⊞ Habitación Individual: si es posible.
- ⊞ Lavado de Manos: Obligatorio. Debe ser realizado con jabón antiséptico en las unidades críticas, intermedias o de inmunosuprimidos.
- ⊞ Guantes: Obligatorio al tener contacto con el paciente, apósitos y/o secreciones.
- ⊞ Lentes: de acuerdo a las Precaución estándar

⊞ Otros: Manguito individual del aparato de presión o utilizar paño como barrera cuando la piel no es indemne; desinfección del fonendoscopio antes y después de su uso (con alcohol 70°C o alcohol yodado).

- ⊞ Abstenerse de tocar con las manos las heridas o lesiones.
- ⊞ Todas las personas que entren en contacto directo con el enfermo vestirán bata, mascarilla y guantes según el tipo de lesión.
- ⊞ Todo el material necesario para vestirse debe de encontrarse preparado dentro de la habitación