

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA


**INTRODUCCION A LA CIRUGIA, PATOLOGIA Y
TECNICAS QUIRURGICAS DE EQUINOS**

SUPER NOTA. COLICOS EN EQUINOS

MVZ. ROBERTO SEDANO BARREDA

VICTOR HUGO BALBOA CASTILLO

02 de abril de 2024



COLICOS EN EQUINOS



¿QUÉ ES?



Cólico es un término general que se refiere al dolor abdominal en el caballo. Los signos de dolor pueden oscilar de leves (mirar al flanco, levantar el labio superior, falta de interés por comer, cocear con las patas traseras hacia el abdomen) a intensos (tumbarse y levantarse repetidamente, girar violentamente sobre la espalda o tirarse al suelo).

TIPOS DE COLICOS

- **Cólico por impactación:** Acumulación de arena, tierra, alimento u otro material no digerible que obstruye el sistema digestivo del caballo; lo que hace que sea difícil o imposible que el caballo estercole.
- **Cólico por gas y espasmódico:** Éstos ocurren cuando se produce una acumulación de gases o líquidos en el sistema digestivo y crean presión. Como resultado, el colon puede generar contracciones o espasmos involuntarios que causan molestias.



CAUSAS

- Dieta alta en grano y baja en forraje ue cuidado.
- Cambios bruscos de alimentación.
- Problemas dentales.
- Parásitos.
- Falta de agua (limpia).
- Ingestión de arena.
- Estrés.



SIGNOS CLINICOS

- Revolcarse
- Rascar el suelo
- Tumbarse largos periodos de tiempo
- Levantarse y tumbarse continuamente
- Mirarse los flancos
- Levantar el labio superior
- Darse patadas en el abdomen
- Posición estirada
- Ausencia de heces durante un periodo mayor a 24h
- Pulso y respiración acelerados



¿POR QUÉ SON PROPENSOS LOS CABALLOS A LOS CÓLICOS?

Los caballos tienen una anatomía especial y, por desgracia, esta particularidad a veces es la que favorece los cólicos.

Por ejemplo, el estómago de los caballos es relativamente pequeño. Como no pueden vomitar, la comida se acumula más rápido de lo normal en el estómago. Además, los intestinos y el mesenterio que los fija están relativamente sueltos. La consecuencia son desplazamientos frecuentes de los intestinos, como torsiones.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

- Analgesia administrada intravenosamente (Banamina o sedación)
- Laxantes administrados directamente en el estómago a través de una sonda nasogástrica (aceite mineral o sulfato de magnesio/sales de Epsom)
- Rehidratación con líquidos orales o i.v

1. Tener una pauta de desparasitación adecuada
2. Hacer una revisión anual del estado de la boca y dientes
3. Administrar medicación solo con supervisión veterinaria
4. Mejorar el manejo del ejercicio

BIBLIOGRAFÍA

<https://www.zooplus.es/magazine/caballos/salud-y-cuidados-equinos/colicos-en-caballos>