

NOMBRE DEL ALUMNO: HEBER LÓPEZ GUZMÁN.

LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOCTENIA.

CUATRIMESTRE: QUINTO.

MATERIA: INTRODUCCIÓN ALA CIRUGIA, PATOLOGIA Y
TECNICAS QUIRURGICAS DE EQUINOS.

DOCENTE: BARREDA ROBERTO GARCIA SEDANO.

TRABAJO: ELABORAR UNA SUPER NOTA SOBRE COLICO EN
EQUINOS.

FECHA: 05/ 04/ 24

CÓLICO EN EQUINOS

1

DEFINICIÓN:

El cólico en equinos es un término general que describe el dolor abdominal y es uno de los síndromes clínicos más frecuentes y graves que afectan a los caballos. No es una enfermedad en sí misma, sino más bien un signo clínico de diversas patologías que pueden afectar el tracto gastrointestinal del animal. El cólico puede variar desde una molestia leve hasta una situación potencialmente mortal, y es una de las principales causas de muerte en caballos.



2

CAUSAS:



El cólico puede ser provocado por una variedad de causas, que incluyen:

- **Impacciones:** Obstrucciones físicas del intestino, a menudo por material alimenticio.
- **Distensión gaseosa:** Acumulación de gases en el intestino.
- **Torsiones o volvulaciones:** Cuando una porción del intestino se tuerce sobre sí misma.
- **Úlceras gástricas:** Lesiones en la mucosa del estómago.
- **Enteritis o colitis:** Inflamación del intestino delgado o grueso.
- **Parásitos:** Infestaciones por parásitos internos como los strongylus.
- **Cambios bruscos en la alimentación,** ingestión de alimentos contaminados o en mal estado, y sobrealimentación.
- **Factores de manejo y estrés:** Como el confinamiento prolongado, el transporte, o el cambio en las rutinas.

3

SIGNOS CLINICOS:

Los signos de cólico en los caballos pueden variar ampliamente, pero

- comúnmente incluyen:
- Inquietud y sudoración.
 - Mirar hacia el flanco.
 - Intentos de echarse o rodar.
 - Patear o morder el abdomen.
 - Negativa a comer o beber.
 - Ausencia o reducción de los sonidos intestinales normales.
 - Frecuencia cardíaca elevada.
 - Dificultad para defecar o heces secas y pequeñas.
 - Distensión abdominal.

SIGNOS DE CÓLICO EN CABALLOS

PREMEVET



Escarbar



Patadas en dirección del abdomen



Sudor excesivo



Falta de apetito



Posición de caballete



Rodar excesivamente


Imágenes: @medicinaequina

4

DIAGNÓSTICO:

Este puede incluir:

- Examen físico completo.
- Palpación rectal (si es seguro y apropiado).
- Análisis de sangre para evaluar el estado de hidratación y función de los órganos.
- Ultrasonografía abdominal.
- Intubación nasogástrica para detectar la presencia de líquido reflujo gástrico.
- Paracentesis abdominal (si se sospecha de líquido en la cavidad abdominal).



5

TRATAMIENTO:



El tratamiento varía según la causa subyacente y la gravedad del cólico y puede incluir:

- Analgésicos para aliviar el dolor.
- Fluidoterapia intravenosa para corregir deshidratación y desequilibrios electrolíticos.
- Medicación para estimular la motilidad intestinal o para tratar infecciones.
- Cirugía, en casos donde hay obstrucciones o torsiones que no pueden ser resueltas médicamente.
- Cambios en la dieta y manejo para prevenir futuros episodios.

6

PREVENCIÓN:

No todos los casos de cólico pueden prevenirse, pero algunas prácticas pueden reducir el riesgo:

- Mantener una dieta consistente con forraje de buena calidad y evitar cambios bruscos en la alimentación.
- Proveer acceso constante a agua limpia y fresca.
- Realizar desparasitaciones regulares basadas en el análisis fecal y las recomendaciones del veterinario.
- Minimizar el estrés mediante un manejo adecuado y ejercicio regular.
- Monitoreo frecuente del estado de salud y comportamiento del caballo.



BIBLIOGRAFÍA: <https://mesace.co/colicos-en-los-caballos/>

<https://www.webconsultas.com/mascotas/primeros-auxilios-para-mascotas/como-reconocer-un-colico-equino-sintomas-y-diagnostico>

<https://blog.terranea.es/colicos-en-caballos/>