UDS

DOCENTE: LIC. AMBAR JAQUELINE ALCAZAR CANCINO

ALUMNA: JUANA EIRIKA VAZQUEZ ALBORES

MATERIA: ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICO

TRABAJO: MAPA CONSEPTUAL

GRADO: 5 CUATRIMESTRE

GRUPO: ENFERMERIA

FECES POSTOPERATORIOS

SALA DE RECUPERACIÓN POSANESTÉSICA

es una zona especializada diseñada para atender a los pacientes durante el periodo postoperatorio inmediato

características de diseño de SPRA

- ambiente controlado
  - temperatura adecuada
  - iluminación adecuada
  - ventilación adecuada
- espacio suficiente para:
  - camas o sillones reclinables
  - monitores de signos vitales
  - equipo de emergencia
  - personal médico y enfermería
- accesibilidad para:
  - camillas
  - sillas de ruedas
  - personal de emergencia
- privacidad
  - separación de otras áreas
  - cortinas o paredes
- disponibilidad de luz y ventilación natural
- fácil mantenimiento y limpieza

monitoreo del paciente en la sala de recuperación

- signos vitales
  - frecuencia cardíaca
  - presión arterial
  - frecuencia respiratoria
  - temperatura
  - saturación de oxígeno
- nivel de conciencia
  - escala de Glasgow
  - orientación
  - respuesta a estímulos
- dolor
  - escala visual analógica (EVA)
  - escala numérica
  - escala de caras
- náuseas y vómitos
  - presencia
  - intensidad
  - frecuencia
- sangrado
  - drenajes
  - apósitos
  - sangrado visible
- diuresis
  - cantidad de orina
  - frecuencia urinaria
  - dificultad para orinar
- signos de complicaciones
  - hipotensión
  - taquicardia
  - bradicardia
  - arritmias
  - hipoxia
  - hipotermia
  - hipertermia
  - convulsiones
  - alteración del nivel de conciencia
  - agitación
  - confusión
  - desorientación
  - alteración del lenguaje
  - alteración por sedantes
- criterios de alta
  - estabilidad hemodinámica
  - ausencia de complicaciones inmediatas
  - control del dolor
  - tolerancia a líquidos
  - ausencia de náuseas y vómitos
  - diuresis adecuada
  - ausencia de sangrado activo
  - criterios de Aldrete
  - criterios de Steward
- documentación
  - registro de signos vitales
  - registro de medicamentos administrados
  - registro de incidentes
  - firma del responsable

CONTROL DE DOLOR EN EL POSTOPERATORIO

- componentes del dolor
  - nociceptivo
  - neuropático
  - mixto
- evaluación del dolor
  - escala visual analógica (EVA)
  - escala numérica
  - escala de caras
  - escala de Wong-Baker
  - escala de Campbell
  - escala de Abbey
  - escala de Doloplus
  - escala de Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)
  - escala de Critical Care Pain Observation Tool (CPOT)
  - escala de Behavioral Pain Scale (BPS)
  - escala de Nociceptive Flexion Reflex (NFR)
  - escala de Ramsay
  - escala de Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)
  - escala de Glasgow
  - escala de Aldrete
  - escala de Steward
  - escala de Bromage
  - escala de Bloomsbury
  - escala de Ramsay
  - escala de Richmond
  - escala de Glasgow
  - escala de Aldrete
  - escala de Steward
  - escala de Bromage
  - escala de Bloomsbury
- analgesia controlada por el paciente
  - bomba de analgesia controlada por el paciente (PCA)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente epidural (PCEA)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente intravenosa (PCIA)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente subcutánea (PCSA)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente intramuscular (PCIM)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente intranasal (PCIN)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente oral (PCO)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente transdérmica (PCTD)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente sublingual (PCSL)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente rectal (PCR)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente vaginal (PCV)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente ocular (PCO)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente auricular (PCA)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente nasal (PCN)
  - bomba de analgesia controlada por el paciente bucal (PCB