

# Ginecología y Obstetricia.

## 1. ¿Cuáles y Cuántos son los planos de Hodge?

- Niveles usados para dividir imaginariamente la pelvis.
- Desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior.
- Evalúa el descenso de la cabeza fetal durante la fase expulsiva del trabajo de parto.
- Plano 1: Va desde el promontorio del sacro hasta el borde superior de la sínfisis púbica. - Presentación libre.
- Plano 2: Va desde la 2da vertebra del hueso sacro hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana. - Presentación fija.
- Plano 3: Desde la altura de las espinas ciáticas, pasa por isquion y 4º vertebra sacra - Presentación encajada.
- Plano 4: Extremo inferior del coxis y paralelo a las demás planas. Previa al alumbramiento - Presentación encajada.

## 2. ¿Definición de aborto?

Se define como la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal?

## 3. ¿Clasificación Clínica del aborto?

- \* Amenazo de aborto
- \* Aborto en curso
- \* Aborto retenido
- \* Aborto recurrente.

## 4. ¿Triada clásica del aborto?

- Dolor en piso pélvico - expulsión del huevo
- metrorragia.

## 5. ¿Signos y Síntomas del aborto?

- \* Sangrado vaginal
- \* Expulsión de coágulos
- \* Dolor en áreas específicas como:
  - Abdomen (cólicos).
  - Pubis
  - espalda
  - vientre
- \* Dolor lumbar
- \* Infección de orina
- \* Infección vaginal.

## II - Esquema de vacunación en embarazadas.

- Vacuna - Hepatitis A - Antes del embarazo - Durante - Después - tipo inactivo - vía IM.
- Vacuna - Hepatitis B - Antes, Durante, Después del embarazo - Inactivado - IM
- Virus del Papiloma humano (VPH) - A partir de los 10 años - Durante NO - Después si a partir de los 10 años - Inactivado - IM.
- Influenza - Antes sí - Después sí - Después sí - inactivada - IM.
- Triple viral (SRP) - sí entrar el embarazo por 4 semanas - Después NO - sí entrar por 4 semanas - Viva - IM.

## 7. Monitoreo de Leopold que es?

Son las palpaciones abdominales que se realizan en la mujer embarazada, para determinar la presentación, situación, y posición del feto.

- 1er monobro - Evalúa la altura del fondo uterino
- 2do " - Evalúa la posición fetal
- 3ra " - Evalúa la presentación fetal.
- 4ta " - Evalúa el grado de encajamiento.

- Los monobros se pueden hacer a partir de los 28 Sem.  
- La primera monobro solo de 20-22 Sem.

## 8. ¿Cuáles son las fases del trabajo de parto?

- Primer etapa - Periodo de dilatación: (o trabajo de parto). Cuenta con dos fases, inicial y activa.
- Segunda etapa: Periodo de expulsión; Se trata del nacimiento del bebé.
- Tercer etapa: Periodo de alumbramiento. Se trata de la expulsión de la placenta.

## 9. Definición de parto?

Conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del producto, la placenta y sus anexos por vía vaginal.

## 10. Definición de parto Prematuro o Pretermino?

Es lugar que tiene entre la semana 20.1 y la 36.6 de gestación y/o con un peso mayor de 500 gramos y que respira o manifiesta signos de vida.

11. ¿ Definición de parto de término?  
Embarazo que dura entre 39 Semanas, 0 días y 40 Semanas y 6 días. Esto significa que su embarazo duró entre 4 semanas antes y 1 semana después de su fecha prevista de parto.

12. ¿ Definición de parto posttérmino?  
Bebé que nace después de las 42 Semanas de gestación

13. ¿ Clasificación de trastornos hipertensivos del embarazo?

- \* Preclampsia - eclampsia.
- \* hipertensión - crónica (preexistente).
- \* Preclampsia - eclampsia superpuesta a hipertensión crónica.
- \* hipertensión - gestacional.

14. ¿ Que significan los siglas RPM y PCUI?

- Ruptura Prematura de Membranas (RPM)
- Restricción del crecimiento intra uterino (RCIU).

15. ¿ Definición de ruptura Prematura de membranas?

Ruptura espontánea de la membrana corioamniótica que se produce antes del inicio del trabajo de parto, con lo consiguiente salida de líquido amniótico independientemente de la edad gestacional en el momento que se produce.

Sayiko Montserrat Luna Gomez.