



Nombre de alumno: Maribel Sánchez Jiménez

Nombre del profesor: DR. Cesar Alexis García Rodríguez

Nombre del trabajo: Cuestionarios

Materia: Ginecología y Obstetricia

Grado: 5° cuatrimestre

Carrera: LIC. Enfermería

Fecha: 11/03/2024

Ocosingo, Chiapas 11 de marzo del año 2024

¿Cuáles y cuántos Hodge? Cuatro planos que dividen imaginariamente la pelvis de la madre y sirven para calcular la ubicación del feto y evaluar el descenso de la cabeza durante la fase expulsiva del parto. Son 4 zonas o planos numerados de arriba abajo y dividen desde la parte estrecha superior de la pelvis hasta la parte estrecha inferior.

2º Definición de aborto? Interrupción espontánea e inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal.

3º Clasificación de la clínica del aborto?

Tipo	Definición.
Temprano	• Aborto antes de las 12 semanas de gestación.
Tardía	• Aborto entre las 12 y las 20 semanas de gestación.
Espontáneo	• Pérdida de embarazo antes de 20 semanas de edad gestacional.
Inducido	• Terminación del embarazo.
Amenaza de aborto	• Sangrado vaginal antes de las 20 semanas de gestación sin dilatación cervical.
Inevitable	• Sangrado vaginal o rotura de membranas antes de las 20 semanas de edad gestacional acompañada de dilatación del cuello uterino.
Incompleto	• Dilatación del cuello uterino y expulsión de algunos productos de la concepción.
Completo	• Cuello uterino cerrado después de la expulsión de todos los productos de la concepción.
Retenido	• Muerte de un embrión o un feto que no es expulsado y que no produce sangrado o dilatación cervical (también llamado huevo muerto y retenido, feto muerto, embarazo anembrionado o pérdida embrionaria intravterinal).
Recurrente o habitual	• 2 a 3 abortos espontáneos
Séptico	• Infección grave de los contenidos uterinos durante o poco antes o después de un aborto.

4º ¿Tríada del clásico del aborto? Tiene una sintomatología característica compuesta por anemia, ictericia y cianosis, lo q' contribuye al llamado síndrome triacolor (pálido por la anemia, amarillo por la ictericia y azul por la cianosis).

5º Signos y síntomas del aborto incluyen la eliminación de fluidos, sangre o tejido por la vagina, y dolor en el estómago o la zona lumbar.

6º ¿Esquema de vacunación de embarazadas? La embarazada no vacunada debe recibir 2 dosis de una vacuna de toxoide tetánico y diftérico, este último en dosis reducida (Td) con un intervalo de 4 semanas y una tercera dosis entre 6 y 12 meses después, una cuarta dosis al año de la tercera y una quinta dosis al año de la cuarta.

7º ¿Que son las maniobras de Leopold? Consiste en 4 acciones distintas q' ayudan a determinar la estática fetal y q' junto con la evaluación de la pelvis materna, pueden indicar si el parto será complicado o si resultará necesario realizar una cesárea.

- Evalúa la altura del fondo uterino
- Evalúa la posición fetal
- Evalúa la presentación fetal
- Grado de encajamiento

8º ¿Cuáles son los pasos del trabajo del parto?
Primera etapa: período de dilatación (o trabajo de parto) cuenta con dos fases, inicial y activa. Las contracciones provocan la dilatación gradual del cuello uterino, q' se va haciendo más delgado hasta llegar a desaparecer borrarmente y copla q' el feto pase a la vagina.

Segunda etapa: período de expulsión. se trata del nacimiento del bebé.

Tercera etapa: período de alumbramiento. se trata de la expulsión de la placenta.

9º Definición del parto: Es el conjunto de fenómenos fisiológicos que determinan y acompañan la expulsión del feto y los anexos ovulares, desde la cavidad uterina al exterior a través del canal del parto.

10º Definición de parto prematuro o pretérmino: Es el q' ocurre antes de las 37 semanas de gestación (OMS 1970-77) el límite inferior de edad gestacional (EG) q' establece el límite entre parto prematuro y aborto es, de acuerdo con las OMS, 22 semanas gestación, 500 g de peso o 25 cm. pretérmino es considerado cuando el nacimiento ocurre entre las 20.1 y 36.6 semanas de gestación (2).

11º Definición de parto postérmino: Embarazo q' dura de 41 a 42 semanas.

12º Clasificación de trastorno de hipertensión del embarazo preclámsia? Eclampsia, hipertensión crónica, preexistente, preeclampsia Eclampsia superpuesta a hipertensión crónica hipertensión gestacional

13º Que significa los siglas RPM y RCU?
Ruptura prematura membrana, Retraso del crecimiento intrauterino.

14º Definición de ruptura prematura de membrana.
Ruptura espontánea de la membrana corioamniótica q' se produce antes del inicio del trabajo de parto.

4º R= Dolor piso pélvico, metrorragia, expulsión del huevo o parto.