

CUDDS

UDS

Patologías y técnicas
quirúrgicas en
Porcinos. H20-

MVZ. Sandra Edith
Moreno López

EMVZ. Eduviges Jocabel
Gómez Navarro.

06-04-2024

La razón para practicarla es prevenir gestaciones y camadas de animales no deseados, otro motivo de gran peso para realizar es prevenir patologías relacionadas con el aparato reproductor

En cerdas a los cinco meses.

Esta cirugía abdominal bajo anestesia, tiene una duración aproximada de 20-45 min y las gatas y perras se recuperan rápidamente del procedimiento.

Es una protuberancia del tejido de algún órgano que puede provocar dolor y aparecer en forma de bulto en la piel de la zona afectada

Pueden aparecer en el diafragma, el estómago o el intestino.

Hernias

Técnicas Quirúrgicas

OSH

Hernia distal

Es una de las principales causas que puede provocar una hernia distal en perros puede ser una caída o un golpe.

Ooforo-Salpingo-histerectomía.

Consiste en retirar los ovarios y el útero.

Sucede cuando los discos amortiguadores de las vértebras se inflaman, se rompen o por el deterioro degenerativo del animal.

Puede prescribir un tratamiento médico antiinflamatorio y reposo estricto durante varias semanas.

Se recomienda a partir de 2 meses de edad y de preferencia antes del primer celo.

El tratamiento
consiste en
reparación
quirúrgicas.

Son los distintos
Procedimientos de
manipulación de las
estructuras anatómicas
con un fin médico, bien
sea diagnóstico, terapéutico o
pronóstico.

Es reportada con
mayor frecuencia en
cachorros de Perros
y gato.

El diagnóstico
se realiza al no
poder inducir una sonda
nasogástrica u orogástrica
en el estómago.

Técnicas
Quirúrgicas

Atresia
anal

La anomalía puede
sospecharse con la
ecografía prenatal
debido al hallazgo
de polihidramnios.

Atresia
esofágica

Atresia

Se define
como la falta
de comunicación
del recto y el
perineo a
través del ano.

Esta formación
incompleta del esófago
suele asociarse con
fístula traqueo-
esofágica.

Los signos
clínicos de un
paciente con
anestesia anal
suelen detectarse
entre los 30 y 90
días de edad,
generalmente después
del destete.

El
Conocimiento del
desarrollo embrión-
ario normal del
sistema urogenital
y del intestino terminal
permite comprender
mejor las causas que
originan las malformaciones
anorrectales.

A pesar de que
este proceso ha
sido tema de
estudios y discus-
ión durante más
de 100 años, no se ha
logrado comprender del todo.

Hernias Porcinas

Todas las edades.

Masa que sobresale del ombligo y abdomen, debajo y delante de los testículos o en la ingle.

Debera tratarse a un corral con cama de manera que la piel que recubre la hernia no se dañe y ulcere.

Atrésia Porcina

Los antibióticos normalmente son las pleuromutilina como tiamulina y Valnenumulina, los macrólidos como la tilosina y tilvalosina y lincosamidas como la lincosamicinas.

Estos antibióticos pueden administrarse vía intramuscular u oral en el agua o alimento según se requiera.