



Nombre de alumno: Alan Hassan Moreno Hernandez

Nombre del profesor: Mvz. Sandra Edith Moreno Lopez

Nombre del trabajo: Cuadro Sinoptico

Materia: Patología y Técnicas Quirúrgicas de Aves y Conejos

Grado: 5°

Grupo: Medicina Veterinaria y Zootecnia

FARMACOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN CONEJOS

Antiinfecciosos

Amikacina

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento de infecciones locales o sistémicas como traqueobronquitis, neumonía, osteoartritis, infecciones de las vías urinarias, gastrointestinales o cutáneas ocasionadas por bacterias Gram negativas y Gram positivas

Como: E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Enterobacter, Serratia, Shigella, Mycoplasma y Staphylococcus

CONTRAINDICACIONES

No administrar a pacientes con hipersensibilidad al componente de la fórmula.

POSOLOGÍA

SC o IM 10 mg/kg, cada 8-12 hrs

Enrofloxacina

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas, dérmicas y genitourinarias

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales sensibles a sus principios activos

POSOLOGÍA

SC 5 -10 MG/KG Cada 12 hrs, PO, IM o SC

Antiparasitarios

Ivermectina 1%

INDICACIONES

El uso principal es la ivermectina para conejos con sarna. La sarna es una enfermedad causada por ácaros que provoca picor, molestias y lesiones

CONTRAINDICACIONES

Contraindicada en casos de hipersensibilidad a la ivermectina, durante el embarazo y la lactancia

RAM

Mareos, pérdida de apetito, náusea, vómitos, dolor o distensión estomacal, diarrea, estreñimiento, debilidad, temblor incontrolable de una parte del cuerpo, molestia en el pecho,

POSOLOGÍA

S.C 0.2 - 0.4 Microgramos/kg, repetir a 10 - 15 días

Levamisol

INDICACIONES

Tratamiento de infestaciones parasitarias ocasionadas en: Parásitos gastrointestinales: Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Haemonchus placei, Ostertagia circumcincta, Ostertagia ostertagi, Cooperia spp., Strongyloides, sp., Oesophagostomum sp., Nematodirus sp, etc..

CONTRAINDICACIONES

No utilizar por vía IV porque puede producir intoxicación y muerte

POSOLOGÍA

Oral o sc 15 mg/kg, 1 sola toma

Analgésicos

Meloxicam

INDICACIONES

Alivio de la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos

CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes

No usar en animales en gestación o lactancia

RAM

Evitar su uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, ya que existe un riesgo potencial de toxicidad rena

POSOLOGÍA

0,6 mg/kg IM, SC diario

No usar en animales que presenten trastornos gastrointestinales como irritación y hemorragia, disfunción hepática, cardíaca o renal y trastornos hemorrágicos

Antibióticos

INDICACIONES

Tratamiento de heridas accidentales o quirúrgicas, llagas, úlceras y abscesos abiertos

POSOLOGÍA

100-250 mg . por ani- mal durante 7 días via oral. Por via intra- muscular hay que tener en cuenta que apa- rece un efecto muy irritante.