



**Nombre de alumno: Heidi Isabel Trujillo
Gracia**

**Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno
López**

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

**Materia: Patología y técnicas quirúrgicas
de aves y conejos**

Grado: 5°

**Grupo: Medicina veterinaria y
zootecnia.**

Ocosingo, Chiapas 9 de marzo del 2024

FARMACOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN CONEJOS

Buprenorfina	Indicaciones	esta indicado para aliviar los dolores de intensidad moderada a severa en pacientes con periodo posoperatorios
	Contraindicaciones	se utiliza en traumatismos, infartos agudos del miocardio o en pacientes con dolor secundario o enfermedades terminales
	Ram	no usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia
	Posologías	no se administra por vía intratecal o peridural
		utilizar con precaución en animales con insuficiencia hepática, especialmente en casos de vías biliares
		puede causar fiebre, confusión, ritmo cardiaco rápido, agitación, vómitos, diarreas, nauseas, pérdida de coordinación
		0.01-0.05 mg/kg, vía SC, IM, 6- hrs
Butorphanol	Indicaciones	es indicado en casos de apreciar analgesia de corta duración
	Contraindicaciones	no utilizarlo en pacientes con hepatopatía severa
	Ram	no usarlo en hembras gestantes
	Posologías	no usarlo en casos de lesiones cerebral
		no usar en animales con enfermedad renal
		causa nerviosismo, escalofríos, sedación seguidos de agitación, ataxia leve que persiste de 3 a 10 minutos
		0.1-0.5 mg/kg, vía SC, 3hrs
Carprofeno	Indicaciones	indicado para el alivio del dolor e inflamaciones y para el control de dolor post-operatorio asociados con tejidos blandos
	Contraindicaciones	no usarlo en pacientes que hayan demostrados hipersensibilidad
	Ram	no usarlo en hembras gestantes
	Posologías	no utilizarlo en hembras lactantes
		no usarlo en pacientes que presenten enfermedades cardiacas, hepáticas o renales
		causa vómitos, heces blandas, diarrea, pérdida de apetito, letargia
		4 mg/kg vía SC diaria
Cloranfenicol	Indicaciones	esta indicado para infecciones oculares y con mayor sensibilidad a bacterias
	Contraindicaciones	puede ser eficaz contra algunos organismos patógenos unicelulares (protozoos)
	Ram	no utilizarlo en animales destinados para consumo humano
	Posologías	no usarlo en hembras gestantes y lactantes
		puede provocar reacciones de hipersensibilidad (alergias), puede causar irritación en la piel y los ojos
		100-250 mg/animal, durante 7 días
Colistina	Indicaciones	utilizado para el tratamiento y profilaxis de infecciones en animales
	Contraindicaciones	no se utiliza en caballos
	Ram	no hay reacciones adversas relacionadas con el uso del sulfato de colistina por vía oral y a la dosis recomendada
	Posologías	20.000-50.000 U.I. por kg por vía parenteral
Tetraciclinas	Indicaciones	se usa para el tratamiento de infecciones causada por bacterias incluyendo la neumonía y otras infecciones del tracto respiratorio
	Contraindicaciones	usado en algunas infecciones de la piel, de los ojos, sistema linfático, aparato digestivo, aparato reproductor y del sistema urinario
	Ram	no utilizar en casos de insuficiencia renal
	Posologías	no usarlo en hembras gestantes
		puede influir negativamente en el crecimiento y desarrollo óseo de los animales
		250 mg/litro de agua de bebida o mezclado en el alimento
		60mg/kg una o dos veces al día
Tramadol	Indicaciones	indicado para los procesos o etiologías que cursen con dolor de moderado a severo de origen agudo o crónico
	Contraindicaciones	se utiliza para el postoperatorio y procedimientos de exploración diagnóstica que cursen con dolor
	Ram	no usar en casos de hipersensibilidad
	Posologías	no usar en pacientes con epilepsia
		efectos en el sistema nervioso central (sedación excesiva, agitación, ansiedad, temblores, mareos)
		5mg/kg por vía IV
Meloxicam	Indicaciones	utilizado para la reducción de dolor post-operatorio
	Contraindicaciones	no usar en animales gestantes o lactantes
	Ram	no usar en animales que presenten trastornos gastrointestinales como irritación y hemorragias
	Posologías	no usar en casos de hipersensibilidad
		estos suelen aparecer al suspender el tratamiento causando anorexia, vómitos, diarrea o letargo
		0.6 mg/kg vía IM, SC diaria
Morfina	Indicaciones	para controlar el dolor trans y posoperatorio en conejos sometidos a cirugía cutánea
	Contraindicaciones	no utilizar en pacientes con hipersensibilidad
	Ram	causa vasoconstricción coronaria y una disminución de la presencia arterial
	Posologías	2-3mg/kg vía SC, IM 2-4 hrs
Petidina	Indicaciones	útil para los procedimientos cortos y para valorar si un animal tiene o no dolor
	Contraindicaciones	contraindicado dentro de las dos semanas posteriores a la última toma del inhibidor de la monoaminooxidasa, debido a que puede producirse excitación o depresión aguda del sistema nervioso central
	Ram	puede causar sequedad de boca, mareos, sudoración, vómitos, constipación, retención urinaria, disminución del lívido
	Posologías	10-20 mg/kg vía S.C, IM 2-3 hrs
Hormonas		es utilizado fundamentalmente para la inducción relacionadas con la reproducción
		la PMSG induce el celo, la GnRH provoca la liberación de los óvulos y la oxitocina induciendo el parto y la lactancia