



Cuadro comparativo

NOMBRE DEL ALUMNO: Liliana Tomas Morales

TEMA: enfermedades

PARCIAL: I

MATERIA: patología del niño y del adolescente

NOMBRE DEL PROFESOR: Dr. Carlos Miguel Barragán Domínguez

LICENCIATURA: Enfermería

CUATRIMESTRE: 5

ENFERMEDADES	AGENTE CAUSAL.	HUÉSPED O HUÉSPEDES.	AMBIENTE O MEDIO DE CONTACTO.	SIGNOS O SÍNTOMAS	PREVENCIÓN PRIMARIA
DIFTERIA	Corynebacterium diphtheriae Bacilo de Klebs-Loffer	Seres humanos menores de 5 años, mayores de 45 años y personas con esquema de vacunacion incompleta.	Ambientes contaminados, gotitas respiratorias expulsadas por el estornudo o tos.	Fiebre y escalofrio Malestar general Dificit. respiratoria Dolor de garganta Vos ronca y disfagia, tos.	Promocion a la salud: No tener contacto con las oersonas enfermas. Proteccion especifica: alimentacion sana, lavarse las manos con agua y jabon. vacunacion: se administra a los 2, 4,6 y 18 meses y una de refuerzo a los 4 años.
TOSFERINA	Bordetella pertussis	humanos	cualquiera	Escalofrios, fiebre, fatiga, malestrar, dificultad para respirar o con ruidos, ronquera, dificultad para tragar, congestion nasal, tos.	Vacunarse: para niños pequeños 2,4,6 y 18 meses refuerzo a los 4 años Para adolescentes: Entre 11 y 12 años Lavarse las manos frecuentemente Usar mascarilla Alejarse de las glomeraciones
TETANOS	Clostridium tetani.	Humanos y mamiferos	Se encuentra comunmente en suelos contaminados con estiércol, asi como objetos contaminados y oxidados	Inquietud, malestar general, aumento del tono muscular, sudoracion, cefalea, insomio, dolor, parestesias alrededor de la herida	Esquema de Vacunacion completa: <ul style="list-style-type: none"> • De 2, 4, 6, y 18 meses • Refuerzo a los 4 años Adolescentes: <ul style="list-style-type: none"> • 11 y 12 años

ENFERMEDADES	AGENTE CAUSAL	HUESPED O HUESPEDES	AMBIENTE O MEDIO DE CONTACTO	SIGNOS O SINTOMAS	PREVENCION PRIMARIA
POLIOMERITIS	poliovirus.	Niños menores de 5 años, diferente sexo	Clima con calor extremo	fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolor en las extremidades	Promoción a la salud, Higiene de alimentos, lavado de manos, Vacunación: a los 2, 4, 6, y 18 meses.
ESCARLATINA	Estreptococos B- hemolítico del grupo A	El reservorio es el ser humano	Se da mediante gotitas respiratorias producto de la tos o el estornudo o por contacto directo con las lesiones del portador	Erupción cutánea de color rojo Líneas de color rojo, Cara ruborizada, Lengua de fresa, Dificultad para tragar, Agrandamiento de glándulas en el cuello (ganglios linfáticos) que son sensibles al tacto, Náuseas o vómitos, Dolor abdominal, Dolor de cabeza y dolores en el cuerpo.	Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable cuando tosa o destornude. Orientar a la población. Lavado de manos al menos 20 segundos. vacunación
SARAMPION	paramixovirus	En general es una enfermedad de la niñez pero puede presentarse en personas de diferentes edades como adolescentes y adultos	Se da durante todo el año en climas templados, las epidemias tienden a presentarse al final del invierno y principios de la primavera.	fiebre alta, Tos seca, moqueo (rinitis), Dolor de garganta, ojos enrojecidos y llorosos (conjuntivitis), Manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca, en la cara interna de la mejilla, también denominados manchas de Koplik Sarpullido constituido por manchas grandes.	Lavarse las manos, uso de cubreboca, ventilar los ambientes de la casa si existe un caso, desinfectar juguetes y más, Vacunas: Primera dosis a los 12 meses Segunda dosis a los 18 meses

ENFERMEDADES	AGENTE CAUSAL	HUESPED O HUESPEDES	AMBIENTE O MEDIO DE CONTACTO	SIGNOS O SINTOMAS	PREVENCION PRIMARIA
BARICELA	virus de la varicela-zóster (VVZ).	Afecta a todas las personas de todas la edades pero prinvipalmente a niños menores de 10 años.	Se precenta en cualquier epoca del año pero mas frecuente en invierno y primavera .	sarpullido que se convierte en ampollas llenas de líquido que pican, que al final se vuelven costras, Fiebre, Cansancio Falta de apetito, Dolor de cabeza.	La mejor forma de prevenir la varicela es vacunándose contra esta enfermedad. Todos incluidos los niños, los adolescentes y los adultos
TUBERCULOSIS	Mycobacteriu m tuberculosis	Humanos y contagiados	Clima, asinamiento, problemas socioeconomico, falta de higiene	Tos, Anorexia, Astenia , Pérdida de peso, Fiebre, También pueden presentar sudoración nocturna, Signos tóxicos inespecíficos o signos de hipersensibilidad como el eritema nodoso.	Higiene, uso de cubrebocas, aislar a personas infectadas Vacuna BCG que se aplica al nacer.