

PARÁSITOS Y PRINCIPALES INTERVENCIONES Y QUIRÚRGICAS EN PORSINOS



Trichostrongilosis o gusano estomacal del cerdo

Trastorno causado por la presencia y acción de parásitos del género *Trichostrongylus* que se alojan en el estómago de los cerdos y que causa gastritis hemorrágica con la consecuente mala digestión y retardo en el crecimiento.

Metastrongilosis-bronconeomonia verminosa porcina

La metastrongilosis es una parasitosis pulmonar del cerdo y el jabalí causada por nematodos pertenecientes al género *Metastrongylus*. Se conoce también como bronconeumonía verminosa o estrongilosis respiratoria del cerdo, ya que cursa con un síndrome bronconeumónico.

Cistecercosis Porcina

Parasites - Cistecercosis. La cistecercosis es una infección parasitaria de los tejidos causada por los quistes larvarios de la tenia porcina. Estos quistes infectan el cerebro, los músculos y otros tejidos y son una de las causas principales de epilepsia en los adultos de la mayoría de los países de bajos ingresos.



Criptorquidios

La criptorquidia es un defecto de desarrollo en el cual los testículos no descienden y se mantienen en el abdomen o en el canal inguinal.

Ascariasis-infección por áscaris

Ascaris suum es un gusano del intestino delgado que, además de diarrea, causa grandes daños porque su ciclo de vida hace atravesar el hígado y los pulmones de cerdo. En infecciones grandes, el daño pulmonar suele causar una gran mortalidad, especialmente porque el uso de antibióticos no mejora la neumonía.

Estrongilosis renal - gusano de rillon

Se trata de una enfermedad parasitaria de los rumiantes producida por *Chabertia ovina*. Por lo general contribuye junto con otros nematodos en las nematodosis gastrointestinales de estas especies domésticas. Presentan una distribución mundial

Castración

Actualmente, la castración se realiza quirúrgicamente, sin anestesia y durante la primera semana de vida del animal. Este procedimiento implica la sujeción e inmovilización del lechón, la incisión del escroto con un bisturí, la exposición del testículo y la sección o desgarro del cordón espermático

Hernias

Hay tres tipos de hernia - escrotal, inguinal y umbilical. La escrotal, evidentemente, sólo se produce en machos, mientras que la inguinal también puede darse, ocasionalmente, en hembras. Las umbilicales son más comunes en machos y se produce por la debilidad de los músculos de la zona umbilical.

