



**Mi Universidad**

**“Super nota”**



**Nombre del Alumno: Johan Rodrigues Morales**

**Nombre del tema: “parasitosis y principales intervenciones quirúrgicas en porcinos”**

**Parcial: 4°.**

**Nombre de la Materia: “patología y técnicas quirúrgicas en porcinos”**

**Nombre del profesor: “ Gonzalo Rodriguez Rodriguez”**


**Nombre de la Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnista.**

**Cuatrimestre: 5° “A”**

# “PARASITOSIS Y PRINCIPALES INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN PORCINOS”

## Trichostrongilosis o gusano estomacal del cerdo.

Es un trastorno causado por la presencia y acción de parásitos del género Trichostrongilosis y estos se alojan en el estómago de los cerdos y que causa gastritis hemorrágica. los cerdos se infectan al ingerir agua y alimentos contaminados con las larvas. Algunas larvas pueden permanecer en las mucosas del estómago sin producir daño por largos meses. cuando las larvas llegan a estado adulto salen de la pared y permanecen en la mucosa del órgano alimentándose de sangre.




## Ascaris suum



## Ascariasis - infección por áscaris.

Esta es una infestación causada por la presencia y acción de áscaris, principalmente en animales jóvenes, las larvas durante su migración causan daño en el hígado y en los pulmones. El parásito adulto se localiza en el intestino delgado. Este parásito se caracteriza por problemas digestivos, respiratorios y nerviosos así como retardo en el crecimiento.

## Metastrongilosis - bronconeumonía verminosa porcina.



Es también conocido como bronconeumonía verminosa o astrongilosis respiratorio del cerdo ya que cursa con un síndrome bronconeumónico, Esto trata de gusano esbeltos de color blanquecino y de 2 a 5 cm de longitud siendo las hembras de talla mayor que los machos. Los machos tienen espículas largas y esbeltas para prenderse a la hembra durante la copula. Es una enfermedad del pulmón. Parasitosis causada por varias especies de metastrongylus, el cual se aloja en la tráquea y en los bronquiolos pulmonares causando distintos grados de irritación.

## Estrongilosis renal - Gusano del riñón


Es una parasitosis causada por a presencia y acción de stephanurus dentatus en los riñones, de la grasa alrededor de ellos, uréteres o en los tejidos cercanos. Se encuentra en grasa penanal, riñones, hígado, páncreas, órganos abdominales, músculos lumbares y canal raquídeo. Y causa lesiones: abscesos, cirrosis, lesiones traumáticas con larvas en hígado, pancreas y riñones, dermatitis en la piel, ganglios linfáticos inflamados o edematosos.

ESTEFANUROS -  
ESTRONGILOSI RENAL  
GUSANOS DEL RIÑÓN.




## Cistecercosis porcina

Es un trastorno causado por la presencia y la acción de estados larvarios de la taenia solium, localizados en el cerdo principalmente en la lengua, músculos maceteros, corazón y músculos diafragmáticos. El huésped definitivo es el hombre. Huésped intermediario el cerdo.



## Castración

la castración en los cerdos se realiza quirúrgicamente, sin anestesia y durante la primera semana de vida del animal. Este procedimiento implica la sujeción e inmovilización del lechón, la incisión del escroto con un bisturí, la exposición del testículo y la sección o desgarrado del cordón espermático.



## Criptorquidias

Es la consecuencia de un defecto en el descenso de uno o de ambos testículos hacia el escroto durante los dos primeros meses de vida. provoca esterilidad de los machos porcinos adultos, igual hay riesgo de cáncer testicular. puede ser uni o bilateral.



## Hernias

La hernia en los cerdos es un problema importante de reproducción, aun así los antecedentes genéticos de la hernia son complejos y muchos genes participan en esta patología. les puede causar enfermedad y probablemente la muerte. Una hernia encarcelada puede cortar el flujo sanguíneo a parte del intestino. la hernia puede ser de dos tipos: hereditario y adquirida, en los cerdos es común la pre-sentación de la hernia en las zonas inguinal y escrotal.

