



Mi Universidad

Mapa conceptual

Nombre del Alumno Jose Eduardo Cordero Gordillo

Nombre del tema: clasificación de parásitos intestinales en perros y gatos

Parcial: 2

Nombre de la Materia: patologías y técnicas quirúrgicas en pequeñas especies

Nombre del profesor: Samantha Guillen Pohlenz

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 5

Parásitos intestinales en perros y gatos

CV

Nematodos

Cestodos

Trematodos

Protozoos

Los nematodos son gusanos microscópicos no segmentados.

Existen nematodos bacterívoros, fungívoros, predadores de otros nematodos, parásitos de insectos y herbívoros o parásitos de plantas.

Son endoparásitos en el tubo digestivo de los vertebrados y ectoparásitos

Tienen ciclos biológicos complejos que involucran varios huéspedes, incluidos los humanos.

son una clase del filo de gusanos platelmintos que incluye especies parásitas de animales, algunas de las cuales infectan al ser humano.

El tamaño de los trematodos varía entre uno y varios centímetros de longitud. Poseen órganos adhesivos (ventosas, ganchos) que los fijan al hospedador.

Los protozoos o protozoarios son organismos microscópicos, unicelulares protistas

viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros seres vivos.

Clasificación inferior: *Áscaris lumbricoides*, *Toxocara cati*.

Reino: Animalia

Alimentación:

Hematófagos-sangre

Histofago-tejido

Quimofago-quimo

Pertenecen al reino animalia y no tienen aparato digestivo.

Puede llegar a medir más de 5 metros

Los trematodos se caracterizan por tener un cuerpo no segmentado, con frecuencia en forma de hoja

Los más comunes son. Clonorchiasis, opistorquiasis, fasciolosis, paragonimiasis.

La reproducción puede ser asexual por bipartición y también sexual por isogametos o por conjugación

Los protozoos suelen ser de 10-50 μm , pero pueden crecer hasta algunos milímetros, y pueden fácilmente ser vistos a través de un microscopio.

Los más comunes son:
cisticercosis y la hidatidosis

Se mueven con unas colas en forma de látigo llamadas flagelos.

Los más comunes son:
Guardia. Entamoeba, eimeria.