



Super-nota

Nombre del Alumno: Judith Guadalupe Pérez Martinez

Nombre del tema: patologías

Parcial: 4º

Nombre de la Materia: patología y técnicas quirúrgicas en pequeñas especies

Nombre del profesor: Samantha Guillen Pholenz

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Cuatrimestre: 5º A

OTOHEMATOMA

¿Qué es? Es un acumuló de sangre localizado a nivel subcondral o intracondral del pabellón auricular.

Infecciones bacterianas o levaduras °estrepococos, pseudomonas, Cándida albicans.

Se desarrolla...en perros de orejas pendulares que rectas y en ocasiones se ha visto en gatos, en lo que es frecuente ver en la parte convexa



Etiología Es desconocida, se cree que las lesiones se producen en el rascado y los movimientos bruscos de la cabeza.

Atención... un vendaje puede ser utilizado para proteger la oreja de contaminación y traumatismo autoinfligido.

Factores primarios parásitos (octodectes cynotis, acaro más frecuente). **Alergias...** (atopia) patología mas llamativa de la otitis.

TECNICAS QUIRURGICAS

1° se observa abultamiento en la cara cóncava de la oreja izquierda.

6° se extraen los coágulos

2° se rasura la zona para tener más campo de visión durante la cirugía.

7° se realiza un lavado con suero fisiológico y luego se sutura con puntos simples.

3° se desinfecta la zona con solución yodada y se procede a la cirugía



4° se realiza una incisión en la oreja para evaluarlo.

8° los puntos deben ponerse siempre verticalmente.

5° se observa con detalle los coágulos del anterior.

Al terminar la cirugía siempre se deja en drenaje.

FÍSTULA PERIANAL EN PERROS

ALIMENTACION

La dieta del perro debe modificarse para incluir más fibra, lo cual permite que las heces sean más blandas, menos dolorosas e incómodas

¿Qué es? se presenta con mayor frecuencia en perros de razas grandes concretamente en el Setter Irlandés y en el Pastor Alemán

Patogenia la cola en esta raza que reduce considerablemente la ventilación de la zona y predispone al cúmulo de secreciones y proliferación de bacterias que afectan las glándulas sudoríparas apocrinas muy numerosas en esta zona periana



Síntomas

Incontinencia fecal

Prurito en la zona anal
Hemorragia anal
Constipación Secreción anorrectal purulenta y dolor severo en la zona. En casos severos y crónicos anorexia y

Tratamiento El tratamiento de elección es quirúrgico y debe realizarse lo antes posible para evitar la progresión de la fistula perianal. tratamientos médicos (antibioterapia, tratamientos tópicos, antiinflamatorios) que empeoran el pronóstico a largo plazo.

Diagnóstico El diagnóstico está basado en el examen físico especialmente de la zona rectal, sumado a la anamnesis del animal.

Producen... se producen infecciones bacterianas mixtas y las lesiones profundizan a la dermis, sacos anales y, en ocasiones, a la mucosa rectal.

PROLAPSO VAGINAL EN PERRAS

En prolapso vaginal es la presencia de una masa rosada que protruye a través de la vulva de la perra.

Se observa más a menudo en hembras jóvenes de razas grandes y braquiocefálicas, lo que sugiere cierto componente hereditario.



En el prolapso la edematización es mucho mayor y la mucosa protruye hacia el exterior.

Tipo 1: de leve a moderada eversión de la mucosa vaginal desde el suelo vaginal ventral craneal hasta la apertura de la uretra, contenido dentro de la luz y el vestíbulo de la vagina. La mucosa visible es rosa pálido, suave y brillante.

El objetivo es prevenir la infección y esperar a que disminuya la inflamación una vez finalizada la fase folicular del ciclo. No es el tratamiento más adecuado puesto que el cuadro recidivará en cada estro.

ECTROPIÓN CANINO

¿Qué es? El ectropión es la eversión del párpado y del borde palpebral, de manera que el párpado inferior cae dejando al descubierto la conjuntiva.

Se trata de un trastorno muy común en razas 'de ojos caídos': cocker, mastín, dogo. Se postula un fuerte componente hereditario



Consiste en eliminar una cuña de tejido del párpado inferior y unir los bordes incididos

La corrección quirúrgica del ectropión no es complicada, aunque como toda intervención quirúrgica, requiere una curva de aprendizaje antes de poder realizarla con garantía

