



## **Mi Universidad**

**Nombre del alumno:** Juan Daniel Lopez Alcazar

**Nombre del tema:** Enfermedades vistas en clases

**Parcial:** 2.-


**Nombre de la Materia:** "Patologías y técnicas quirúrgicas en ovinos y caprinos".

**Nombre del profesor:** Mvz. Samantha Guillen Pohlenz

**Nombre de la Licenciatura:** "Medicina veterinaria y zootecnia"

**Cuatrimestre:** 5.-

**Lugar y Fecha de elaboración:** 08/02/2024 Comitán de Domínguez Chiapas México.



## Enfermedades vistas

### Colibacilosis

-Normalmente es común en ovinos y caprinos, está causada por la bacteria (E. coli). Siendo un bacilo Gram (-). El poder de esta bacteria se presenta en la adhesión que llega a tener debido a sus fimbrias, normalmente es un habitante de la cavidad intestinal, pero en algunas circunstancias puede presentar cepas patógenas. Existen 3 tipos de colibacilosis como (endotoxina, septicémica y diarreica).

### Ectima Contagioso

-Esta denominada como una enfermedad viral, también es llamada como boca castrosa, dermatitis pulposa o dermatitis labial infecciosa. Mantiene una morbilidad del 100% pero 5% de mortalidad, lo que nos quiere decir que todo el rebaño puede padecer la enfermedad si no se detecta rápido. Presentando úlceras, tejido de granulación, lesiones inflamatorias, costras marrones gruesas en boca, nariz, orejas, parparos y patas.

### Mannhemia haemolytica

-Provoca neumonías, causada por diferentes microbios de la familia pasteurella como (pasteurella haemolytica y pasteurella multocida). La mannhemia haemolytica es un cocobacilo Gram (-) siendo un habitante normal de las vías respiratorias superiores en ovejas y cabras. Esta puede ser producida por el estrés que se puede generar durante el transporte, mal tiempo, ventilación etc. Así como la sinergia que llega a ver entre virus y bacterias o bacterias y bacterias.

### Medi-Visna

Enfermedad viral, causada por un lentivirus el cual va afectar a su huésped durante toda la vida, la mayoría de todos los infectados son asintomáticos. Desarrollando síndromes como disnea y signos neurológicos, los cuales llegan a ser mortales. Su modo de transmisión es a temprana edad al ingerir leche y por vías respiratorias. (Medi) se presenta en 3 a 4 años. (Visna) se presenta en un periodo de 2 años.

### Podo dermatitis (Gabarro)

Es la enfermedad podal más frecuente en ovinos y caprinos, siendo una infección que involucra la piel de los espacios interdigitales y lamina sensitiva de la pezuña, causando dolor y por lo tanto claudicación. Ocasionado por la sinergia de bacterias como dichelobacter nodosus y fusubacterium N. Se presenta con el acumulo de heces y orina provocando una humedad haciendo que la bacteria D. nodosus la cual vive en pezuñas prolifere anaerobiamente por las capsulas de lodo dando lugar a F. necrophorus bacterias que vive en heces para dañar tejidos blandos, así como huesos de las falanges.

