Nombre de alumno: Carlos Daniel Ramírez Hernández

Nombre del profesor: Samantha Guillen Pohlenz

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Materia: patologías y técnicas quirúrgicas en ovinos y caprinos

Grado: 5

Grupo: a

Comitán de Domínguez Chiapas a 5 de febrero de 2024.

Afecciones comunes en ovinos

Colibacilosis

A.E E. coli bacteria no esporulado y mesofila se desarrolla en ta ambiente, se adhiere por sus fimbrias para fijarse al hospedador esta se adhiere a una célula intestinal blanca, este agente ataca a los corderos y cabritos de 2-3 días de edad, normalmente la bacteria habita en el intestino del animal, el A.E se secreta por las heces y sobrevive a ta extremas en excremento por varios meses.

- Tres formas diferentes
- Diarreica
- Septicémica
- endotoxina

Ectima contagiosa

A.E poxiviridae es una afección viral que afecta a los ovinos y caprinos, existe una morbilidad de la enfermedad de 100% y baja mortalidad 5%, pero si hay complicaciones bacterianas la mortalidad se eleva. Se dice que el virus es resistente, sobrevive e infecta por más de un año en ta extremas.

También infecta a perros y humanos

Sinónimos de la afección

- Boca costrosa, dermatitis pustulosa infecciosa de oveja estomatitis pustulosa y dermatitis labial

Manhenia haemolytica

A.E pasteurella haemolytica habitante normal del T.R de ovejas y cabras, el estrés durante transporte, mal tiempo, desequilibrios nutricionales, parasitismo, confinamiento y destete están implicados en esta manhemia neumónica, puede producir muerte temprana o pérdida de peso.

Maedi-visna

A.E maedi-visna lentivirus, este virus se integra en el ADN de los leucocitos, P.I de maedi (dos años y sus sx aparecen de 3-4 años), y visna su P.I es corto los sx aparecen de 2 años de edad, la mayoría de las infecciones son asintomáticas, una minoría desarrolla síndromes progresivos, la transmisión se da temprana en el calostro o leche infectada o también por contacto directo

SX

- Son asintomáticas, pero hay algunas formas, de maedi, lo más común es disnea, tos seca, sin fiebre, exudados depresión, depresión

Pododermatitis o gabarro

A.E dichelobacter nodusus y fusubacterium necrophorum, es una enfermedad pódales en ovinos y caprinos, involucra la piel del espacio interdigital, la lámina sensitiva de la pezuña causando dolor. D. nodosus habita en la pezuña donde bajo condiciones adecuadas de anaerobia y humedad favorece a F, necrophorus es el principal responsable de los daños, se encuentra en heces, TGI, piel, pezuña produce toxinas que dañan a la piel, falanges y llega a necrosar.

SX

- Se presenta a las 48 hrs con cojera sin lesiones y de 3-
- Días hay fiebre, postración, inmovilidad, inapetencia, anorexia lesiones podales.

Salmonelosis

A.E salmonella abortus ovis, provoca abortos las fuentes de infección son por secreciones vaginales, placenta, fetos abortados, animales nacidos infectados, heces, calostro y leche se sospecha durante la 2da mitad o último tercio de gx, con mortalidad o debilidad con los nacidos, la transmisión es oral y conjuntival y venéreo, las ovejas pueden ser portadoras asintomáticas.

SX

- Aborto, corderos muertos al nacer o pocos días después de nacidos, diarrea, infecciones pulmonares, fiebre en hembras y también metritis posparto, peritonitis